

Agrometeorológiai előrejelzés márciusra

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.03.2021 Брой: 3/2021



A március eleji rövid távú hidegidőszakot követően a hónap első felének napjain túlnyomó részében az agrometeorológiai viszonyokat a klímai normákhoz és a téli gabonanövények fejlődéséhez szükséges biológiai minimumhoz közeli hőmérsékletek határozzák majd meg. Ebben az időszakban az ország déli régióiban kedvező feltételek alakulnak ki az őszi vetésű növények vegetációjának megindulásához.

A második tíz napos időszak második felében jelentős hőmérséklet-emelkedés és a vegetatív folyamatok aktiválódása várható a téli gabonanövényekben és a többéves ültetvényekben.

A harmadik tíz napos időszakban a mezőgazdasági növények fejlődése felgyorsult ütemben, a normál feletti hőmérsékleti viszonyok között fog folyni. A hónap végén a búza és az árpa túlnyomórészt a szárhasítás

stádiumában lesz, az ország egyes déli és délkeleti régióinak állományában az áttérés a szárhosszabbodás stádiumába megkezdődik. A rozettás stádiumban áttelelt téli repcében tömegesen indul meg az ágazás.

Márciusban a gyümölcstermő növényekben különböző fenológiai stádiumok figyelhetők meg – a rügyduzzanástól és rügyattanástól a korai virágzású csonthéjasok (mandula, kajszi, őszibarack) zöld rügy és virágzás stádiumáig az ország déli régióiban és a Duna-menti síkság egyes területein, ahol a februárban mért normál feletti hőmérsékletek korai fejlődést idéztek elő a gyümölcsösökben.

Márciusban a -7°C -ig várható minimum hőmérsékletek kockázatot jelentenek a legfejlettebb, rügyképződés és virágzás stádiumában lévő gyümölcstermő növényekre.

A márciusra várható, a havi normához közeli csapadék növelni fogja a talajvízkészletet még a két méteres rétegben is. Február végén a művelési régiók nagy részében a téli gabonanövények alatti egy méteres talajréteg vízkészlete a mezős vízkapacitáshoz közeli értékeken állt. Kivételek a Duna-menti síkság egyes területein – Bazovec, Novacsene, Pavlikeni agrometeorológiai állomások, valamint a délkeleti régiókban – Szliven, Karnobat, Dolni Csiflik agrometeorológiai állomások voltak, ahol a búza alatti egy méteres talajréteg vízkészlete a mezős vízkapacitás 90%-a alatt volt.

Márciusban az első tíz napos időszak napjainak nagy részén, valamint a harmadik tíz napos időszak második felében kedvező feltételek lesznek a szezonális agrotechnikai tevékenységek – a vetés előtti talajművelés és a korai és középkorai tavaszi növények (borsó, zab, tavaszi árpa, bükköny) vetése; a gyümölcsösökben a virágzás előtti megelőző kezelések számos betegség (virág- és hajtásmoly, lyukas foltosság, barack levélhajlító, varasodás stb.) ellen – végrehajtásához.

A március második és a harmadik tíz napos időszak első felében várható gyakori csapadék magas nedvességtartalmat tart fenn a talaj felső rétegeiben, ezért a déli régiók egyes területein a napraforgó vetésének agrotechnikai határidejei nem tarthatók be. A napraforgó optimális vetési ideje Dél-Bulgáriában március 15–20. között van, a Duna-menti síkságon pedig a hónap harmadik tíz napos időszakának közepén (március 25. – április 5.) kezdődik.

Forrás: NIMH