

Sárgásbarna foltok árpán (helmintospóriózis)

Автор(и): проф. д.с.н. Светослав Бобев, от Аграрния университет в Пловдив

Дата: 26.01.2014 *Брой:* 1/2014



Sárgásbarna foltok árpán (helmintospóriózis) – *Drethlera tritici-repentis* tavasszal fejlődnek ki az alsó levelek mindkét felületén, és megfelelő körülmények között elérik a zászlóslevelet. A tünetek változatosak, és két megnyilvánulás fordulhat elő önállóan vagy kombinációban. A nekrotikus típusra jellemzőek a kis, sárgásbarna, elhalt foltok, amelyek megnagyobbodva világosbarnává válnak, sárga peremmel és szem alakúvá fejlődnek. A klorotikus megnyilvánulás gyorsan növekvő sárga területekből áll, sötétebb középső résszel. A hálózatos levélfoltosságot okozó kórokozó a következő szezonra a betakarított magvak maghéja alatt és a növényi maradványokban marad fenn. Az első fertőzések fertőzött magvakról vagy szél által terjedő aszkospórákból származnak, amelyek a növényi maradványokban képződött pszeudotéciumokból szabadulnak fel. A foltos leveleken képződő konídiumok további fertőzéseket okoznak, amelyek esős időben a legsúlyosabb károkat idézik elő.