

Kritikus hőmérsékletek a korai virágzású csonthéjas gyümölcsfajok számára

Автор(и): Растителна защита
Дата: 16.03.2021 Брой: 3/2021



Az első tíz nap végén és a második tíz nap elején bekövetkező késő téli időjárási események megszakították az őszi vetésű növények vegetációs folyamatait az ország mezőgazdasági területeinek nagy részén, és komoly próbát jelentettek a fejlettebb állapotú gyümölcstermő növények számára. A Duna-menti síkság és a déli régiók (Plovdiv, Sztara Zagora, Chirpan) egyes helyein mínusz 6-7°C-ot is elérő minimumhőmérsékleteket rögzítettek, amelyek kritikusak lehetnek a rügyfakadás és virágzás stádiumába lépő egyes gyümölcsfák – mandula, kajszibarack – számára.

Március második felében negatív minimumhőmérsékletek várhatók, és megnövekedett a korán virágzó csonthéjas gyümölcsfajok károsodásának kockázata.

A második tíz nap végéig az agrometeorológiai viszonyok nagyon dinamikusak lesznek. A március közepi rövid melegedés és hóolvadás után az időszak második felében a normál alatti hőmérsékletek várhatók, amelyek visszafogják a mezőgazdasági növények fejlődését. Kivételt képeznek a legdélebbi régiók, ahol a napi átlaghőmérséklet eléri és meghaladja a téli gabonanövények vegetációjához szükséges biológiai minimumot. A tél végén a búzaállomány túlnyomórészt a szárhasítás stádiumában lesz.

A következő időszakban jelentős csapadék várható, valamint a talaj nedvességtartalékának növekedése a 100 cm-es rétegben. A téli gabonanövények számára a mezőgazdasági területek nagy részén ez eléri a teljes víztartó képesség (TÖK) 90%-át meghaladó szintet.

Az időszak alatt a feltételek nem lesznek megfelelőek a szezonális talajművelés, valamint a korai és középkorai tavaszi növények vetésének végrehajtásához. Nagy a valószínűsége annak, hogy a napraforgó dél-bulgáriai vetésére vonatkozó, március közepén kezdődő agrotechnikai határidők nem tarthatók be.

Forrás: NIMH