

Április elején az agrárcsoportokban aktív növekedés figyelhető meg a növényi folyamatokban.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.04.2021 Брой: 4/2021



A hegyekben várható hóesés és az április elején előrejelzett lehűlés ellenére az agrometeorológiai viszonyokat az átlagos napi hőmérsékleti értékek fogják meghatározni, amelyek lehetővé teszik a növénytermesztési folyamatok aktív lefolyását a mezőgazdasági kultúrákban. Április elején nem várhatóak kritikus minimumhőmérsékletek a gyümölcsfajok számára, amelyek a fenológiai fejlődésükben előrehaladottak.

Az időszakban a búza és az árpa Dél-Bulgáriában a szárhajtás stádiumában lesz. A Duna-menti síkság kultúráiban a szárhajtás, a szárhajtásba való átmenet és a szárhajtás kezdete következik be. A

gyümölcsfajoknál megfigyelt fenológiai fázisok a rügyfakadás, a rügyezés és a virágzás lesznek. A szőlőben nedvmozgás és rügydagadás zajlik majd.

Az időszakban lehetőség nyílik a szezonális agrotechnikai munkák elvégzésére – a napraforgó vetése és a tavaszi kultúrák vetés előtti talajelőkészítése. Az állandó telepítésekben folytatódnak a kezelések a gyümölcsfajok varasodása, a csonthéjasok korai barna rothadása (virágrothadás) és a lyukas levélfoltosság, valamint a barack levélhajlító gomba ellen. A permetezés maximális hatásfokának elérése érdekében a növényvédelmi tevékenységeket szélcsendes időben, legfeljebb 2–3 m/s megengedett szélsébséggel kell végezni.

Az időszak első napjaiban előrejelzett csapadék átmenetileg korlátozni fogja az agrotechnikai tevékenységek végrehajtásának lehetőségeit.

Forrás: NIMH