

Ideje kiválasztani a gyomnövényirtót a repcénél

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.04.2021 Брой: 4/2021

Галера™
Супер
ХЕРБИЦИД



Ismét számíthat a Galera™ Superre – A legszélesebb spektrumú lomblevelű gyomirtó szer posztemergens alkalmazásra repcében

Kedves Kollégák,

A normál talajnedvesség és a viszonylag meleg 2020 októberi, novemberi és decemberi hónapok miatt az országos repcetermesztés általában az optimális telelési stádiumban van. E hónapok alatti meghosszabbodott vegetációs időszak miatt a gyomok fejlődése is előrehaladott, ami korábbi tavaszi gyomirtó kezelést jelent a növényzet gyomverseny alóli felszabadításához.

A **Galera™ Super** a legszélesebb spektrumú posztemergens lomblevelű gyomirtó szer repcében, amely hatékonyan irtja még a legmakacsabb lomblevelű gyomokat is.

A **Galera™ Super** három, három különböző vegyi csoportból származó hatóanyagot tartalmaz, amelyek kölcsönösen kiegészítő hatással bírnak. A második igazi levéltől kezdve, BBCH 12-39-ig, kilenc vagy több kifejlődött szárköznél alkalmazható, tavasszal és ősszel egyaránt, gyomok jelenlétében. Optimális hatásfokhoz minimum 8°C – 10°C hőmérséklet szükséges.

25 ml/da adagolás és 10-40 l/da permetlé mennyiség mellett alkalmazva repcében a **Galera™ Super** kiváló irtást biztosít búzavirág, székfű, mezei aszat, bindin, keserűfű, disznóparéj, fehér libatop, fekete csucsor, szellőrózsa, holt csalán, pipacs, galaj, takácsmácsonya, veronika, ibolya, holt csalán, pipacs, pásztortáska, önkéntes napraforgó stb. ellen. További talajaktivitásának köszönhetően a **Galera™ Super** irtja a később kikelő gyomokat is.

Ha bármilyen okból kifolyólag kudarcot vall a **Galera™ Superrel** kezelt repce – talajfagyás, fagy, betegség vagy kártevő támadás miatti sérülés esetén, ugyanazon a területen lehetőség van legalább 1 hónappal a kezelés után, és elővetései talajművelés (szántás) után mustár, palántás káposzta, búza vagy kukorica vetésére.

A **Galera™ Super** gyakorlati előnyei, amelyek kitűnnek:

- Egyidejűleg veszik fel a levelek és a gyökerek, és transzlokálódik a teljes gyomnövényben
- További talajaktivitás
- Széles alkalmazási ablak
- Hatékony önkéntes napraforgó és borsó ellen
- Háromkomponensű termék, három különböző vegyi csoportból származó hatóanyagokkal
- Szelektív, posztemergens, szisztémás gyomirtó szer
- Egyidejűleg veszik fel a levelek és a gyökerek
- Nagyon gyors felvétel a gyomok által – 1 órán belül
- A hatás láthatóan gyorsabb meleg és nedves körülmények között
- Könnyen alkalmazható folyékony formuláció – oldható koncentrátum (SL)
- Alkalmazható ősszel és tavasszal egyaránt
- A hatóanyagok különböző hatásmódja és kölcsönösen kiegészítő hatása