

# Április havi agrometeorológiai előrejelzés

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 18.04.2021 Брой: 4/2021



Április első szakaszában az agrometeorológiai viszonyokat a klímánormál feletti hőmérsékletek fogják meghatározni. A normál feletti hőmérsékleti viszonyok előrejelzése felgyorsítja a téli gabonafélék vegetációs folyamatait, és a vetésterületek állományainak nagy része tömegesen lép a szárhajtás szakaszába. A repcénél az elágazódás és a bimbózáskor kezdete figyelhető meg.

A szakasz napjainak nagy részében jelentős csapadékra nem számíthatunk, és az ország számos részén lehetővé válik a vetés előtti talajművelés és a

napraforgó vetés. Április első szakasza a napraforgó vetés agrotechnikai határideje Észak-Bulgáriában.

Az első szakasz végén és a második szakasz elején hőmérséklet-csökkenés, az időjárás stabilizálódása és az agrometeorológiai viszonyok jelentős változása várható. Ebben az időszakban jelentős csapadékot és a talajvízkészlet növekedését jósolják, beleértve a kétszéles réteget is. A tavasz elején a vetésterületek nagy részén a búza egy méteres talajrétegében a vízkészlet a teljes vízkapacitás 90%-a fölé emelkedett. Kivételt képeznek néhány keleti régió – a razgradi, a dolni chifiliki és a szlivéni agrometeorológiai állomások –, ahol a vízkészlet szintje alacsonyabb, a teljes vízkapacitás 80%-a alatt van.

*Április első szakaszának végén és a második szakasz elején az időjárás rövid távú stabilizálódását és megfelelő feltételeket jósolnak egyes sürgős növényvédő permetezések lebonyolításához a gyümölcsösökben: a virágrügy-fejlődés szakaszában a almatermesű fajoknál (alma, körte) a varasodás ellen; a virágzás utáni kezelések néhány korai virágzású csonthéjas gyümölcsfajnál a virágghalál (korai barna rothadás) és a lyukasfoltosság ellen; a cseresznye és a meggy esetében a legveszélyesebb gombabetegség, a cilindrosporiasis (ún. fehér rozsda) és mások ellen.*

Április második szakaszában a mezőgazdasági növények fejlődése lassabb ütemben fog folyni, a normál alatti hőmérsékleti viszonyok között. A szakasz végén fagyok kialakulásának megnövekedett valószínűségét jósolják, amit figyelembe kell venni a zöltség- és dohánypalánták edzése során. Az előrejelzett minimum hőmérsékletek, egyes helyeken mínusz 2–3°C-ig, kritikusak lehetnek a gyümölcsfák virágai és fiatal termésügyei számára, ha hosszabb ideig tartanak.

A harmadik szakasz elején felmelegedés várható, és a vetésterületeken a talajhőmérséklet a tízcentiméteres rétegben eléri a gabonakukorica vetéséhez megfelelő értékeket.

A harmadik szakaszban a mezőgazdasági növények vegetációja mérsékelt ütemben fog folyni, a klímánormálishoz közeli hőmérsékletek mellett. Ebben az időszakban a téli gabonaféléknél a szárhajtás szakaszából a kalászerés és

a kalászszakasz felé történik az átmenet. A repcénél a virágzás szakasza lesz meghatározó.

*Áprilisban a gyakori csapadékok kedvező feltételeket teremtenek számos gombabetegség fertőzési hátterének növekedéséhez a gyümölcsösökben – a virághalál (korai barna rothadás), a varasodás, a lyukasfoltosság, az őszibarack levélhajlás és mások esetében. A gyümölcsfélék növényvédő permetezéseinek lebonyolításához megfelelőbb feltételek az első szakasz napjainak nagy részén és a harmadik szakasz első felében állnak majd elő.*

*Forrás: NIMH*