

Agrometeorológiai előrejelzés május hónapra

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.05.2021 Брой: 5/2021



Idén a tavasz első felében uralkodó hűvös időjárás késleltette a mezőgazdasági növények fejlődését. Májusban a napok nagy részében az agrometeorológiai feltételeket az instabil időjárás fogja meghatározni.

A május elejére előrejelzett átlagnál magasabb hőmérséklet felgyorsítja a vegetatív folyamatokat az őszi vetésű állományokban és a vetett tavaszi növényekben. Az első évtizedben a búzánál a szárhajtás, a kalászerés átmeneti szakasza és a kalászerés különböző stádiumai következnek be. Az árpa déli régiókban (Agrometeorológiai Állomás, Szandanszki) virágzása figyelhető meg. A repcénél virágzás, megtermékenyítés és hüvelyek képződése zajlik.

A hónap eleji meleg időjárás után az első évtized második felére a hőmérsékleti viszonyok normalizálódása várható. Ebben az időszakban várt csapadék késleltetni fog néhány szezonális agrotechnikai tevékenység végrehajtását – a kukorica vetés befejezését, a vetés előtti talajművelést és a késői, hőigényes tavaszi növények (bab, gyapot, földimogyoró stb.) vetését.

A második és harmadik évtizedben a mezőgazdasági növények fejlődése mérsékelt ütemben fog folyni, a napi középhőmérsékletek a klimatikus normák közelében maradva. *A május második felében várt csapadék a talaj 50 cm-es és 100 cm-es rétegében a nedvességtartalékok nagyon jó szintjét fogja tartani, meghaladva a teljes víztartó képesség (TÖK) 85%-át. Kedvező hatással lesz az őszi gabonanövényekre, amelyekben a szemképződés és a szemtöltődés folyamatban lesz. Május végén a déli régiók búza- és árpaállományainak egy részében a tejérettség stádium kezdete figyelhető meg.*

A hónap folyamán a kukoricánál és a napraforgónál levélképződés zajlik. Május végén az agrotechnikai határidőn belül vetett napraforgónál a virágzat képződése figyelhető meg.

A gyümölcstermő növényeknél a terméskötődés kialakulása és növekedése következik be. A szőlőnél a virágzat előbukkanása, a hónap végén pedig a virágzás kezdete figyelhető meg – ezek a stádiumok kritikusak a lisztharmat fertőzés szempontjából.

A májusban gyakori csapadék számos gombabetegség fejlődéséhez kedvező feltételeket teremt: rozsdák (barna, sárga) és szeptóriózis a búzánál; lisztharmat a zöldségnövényeknél és a szőlőnél; virág- és rügymolyhás, lyukaslevelűség és varasodás a gyümölcsfáknál stb. A hónap folyamán a növényvédő permetezések végrehajtására kedvezőbb feltételek az első évtized elején, a második évtized közepén és a harmadik évtized elején állnak elő.

Májusban a mezőgazdasági növényekre kritikus minimumhőmérsékletek nem várhatók, azonban a jégverés valószínűsége továbbra is megnövekedett. Jégkár esetén ajánlott a károsult növényállományt első adandó alkalommal réztartalmú gombaölő szerekkel kezelni a sebek gyorsabb gyógyulása és a másodlagos fertőzések kockázatának csökkentése érdekében.

Forrás: OMSZ