

Hagymák kártevőirtó rendszere

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.05.2021 Брой: 5/2021



Kártevő – Hagymalégy *Delia antiqua*

Kártétel

A kikelő lárvák a levelek tövébe fúrnak, járatot rágnak a szárban, majd a hagymagumóba hatolnak. A károsított növények elmaradnak a növekedésben, elsárgulnak, előhajolnak, könnyen kihúzhatók, és végül kiszáradnak. A kártétel következtében a szövetek erjedni kezdenek, és kellemetlen, rothadt hagyma illatot bocsátanak ki.

Védekezés

A legyek rajzásának kezdetét április második dekádjában várják. A fertőzött növényeket azonnal el kell távolítani és megsemmisíteni. Az első kezelést a tömeges rajzás időszakában kell elvégezni, ami egybeesik a meggy virágzásával. Gazdasági kárküszöb: 5 légy/10 entomológiai hálós súrolás.

Kártevő – Dohánytripsz *Thrips tabaci*

Kártétel

A tripszek nedveket szívnak a levelekből, amelyeken fehéres foltok jelennek meg. Erős fertőzés esetén a foltok összeolvadnak, és az egész levél fehérré válik. A foltokon apró fekete pontok figyelhetők meg – ezek a kártevő ürüléke.

Védekezés

Áprilisban a dohánytripszre már a megjelenésének kezdetétől figyelni kell, amikor az áttelelt növényi maradványokról vagy gyomokról a hagymára költözik.

Kártevő – Lisztharmat *Peronospora destructor*

Kártétel

A leveleken klorotikus, halványzöld, elliptikus foltok jelennek meg, amelyek nedves időjárás esetén ibolyaszínű, sporuláló bevonattal borulnak be. Kedvező feltételek a fertőzéshez 3–25 °C hőmérsékleten és a növényeken megmaradt vízcseppek jelenlétében alakulnak ki.

Védekezés

Az önkéntes és elsődlegesen fertőzött növények kiirtása. A betegség első foltjainak észlelésekor vegetációs kezeléseket kell végezni. Száraz időjárási időszakokban a kezeléseket ritkábban is elvégezhetők.

A hagymafélék kezelésekor adjunk hozzá adhezívumot!