


Мájus végén – mezőgazdaságilag jelentős csapadék az ország keleti régióiban

Автор(и): Растителна защита
Дата: 21.05.2021 Брой: 5/2021



Az elmúlt hétnapos időszakban a vetőterületek nagy részén, Kelet-Bulgária néhány pontját kivéve, gazdaságilag jelentős, 20–25 l/m² feletti csapadék hullott. Észak-Bulgária egyes régióiban – Knezsa, Orjahovo, Lom – a mennyiségek meghaladták a 40 l/m²-t, ami javította a talaj nedvességtartalmát és a mezőgazdasági növények fejlődésének feltételeit.

A következő időszak elején további csapadékot jósolnak, amely mennyiségileg ismét jelentősebb az ország keleti régióiban, ahol a talaj 50 cm-es rétegében a nedvességtartalékok javulása várható. A téli és tavaszi növények növekedési folyamatai a normál körüli és feletti hőmérsékletek mellett, jó nedvességellátás mellett, szokásos ütemben zajlanak majd. A búzában a virágzás, a megtermékenyítés és a szemképződés fázisai

következnek be, az árpában pedig a déli régiókban a tejérletség szakaszának kezdete is. A téli repcében a hüvely- és magképződés zajlik majd. A kukoricában és a napraforgóban a levélképződés folyamata folytatódik. A szőlőben tömeges virágzatleválás következik be. A gyümölcsfajoknál a gyümölcsök növekedésének gyorsulása figyelhető meg.

Az időszak közepén kedvező feltételek alakulnak ki a növényvédő permetezések elvégzéséhez a zöldségfélékben és a szőlőben a lisztharmat, valamint a csonthéjas gyümölcsfajokban a barna rothadás ellen. A jégeső által károsított gyümölcsfákat réztartalmú gombaölő szerekkel kell kezelni a gombabetegségek megjelenésének korlátozása érdekében.

Forrás: NIMH