

# Szőlőültetvények kártevőirtó rendszere májusban

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 27.05.2021 Брой: 5/2021



Fejlődési fenológiai fázis – virágzatelkülönülés – virágzás

Kártevő – Szőlő lisztharmat *Plasmopara viticola*

## Kártétel

A betegség leggyakrabban a leveleket és a fürtöket támadja meg. A fertőzött leveleken a betegség megnyilvánulása halványzöld, kerek (olajos) foltok képződésében nyilvánul meg. Párás időben a foltok a levél

fonákján szürkésfehér penész borítja be. Amikor a fürtöt közvetlenül a virágzás után fertőzi meg, a fiatal bogyók elsötétednek, szürkésfehér bevonattal borulnak be és kiszáradnak.

## Védekezés

Az első kezelést akkor kell elvégezni, amikor kedvező fertőzési feltételek állnak fenn (levegő hőmérséklete 13°C felett, gyakori de enyhe csapadék) és a szőlő érzékeny fenológiai fázisában van („virágzás” – „borsószem-nagyságú bogyó”). Cél az olajos foltok megjelenése előtti kezelés. Érintkező gombaölőszerek alkalmazásakor a permetezések közötti időköz 3-7 nap, lokálisan szisztémás gombaölőszereknél 7-10 nap, szisztémás gombaölőszereknél pedig 10-14 nap.

**Kártevő – Szőlő lisztpenész** *Oidium tuckeri*

## Kártétel

A betegség főként a levelek felső oldalán nyilvánul meg, ahol sárgászöld foltok szürkésfehér bevonattal képződnek. Amikor a fürtöket a virágzás után támadják meg, a bogyókon apró, fehér bevonattal borított foltok keletkeznek.

## Védekezés

Az első megelőző permetezést akkor kell elvégezni, amikor a hajtások elérik a 10-15 cm hosszúságot. A további kezeléseket 8-10 naponként kell elvégezni, az éghajlati viszonyoktól, a fajta érzékenységtől, a fertőzöttség mértékétől és az alkalmazott gombaölőszer hatásmódjától függően.

**Kártevő – Szürkepenész** *Botrytis cinerea*

## Kártétel

A virágzatok károsítása a virágok megbarnulásában nyilvánul meg, amelyek később kiszáradnak és lehullanak.

## Védekezés

Meleg, párás időben, közvetlenül a virágzás után megelőző permetezést kell végezni az egyik bejegyzett gombaölőszerrel.

## Kártevők

## Kártevő – **Szőlőmoly** *Lobesia botrana*

### **Kártétel**

Májusban a kártevő első generációjának lárvái károsítanak, a virágokat rágják és selyemszálakkal összefonják. A lárvák gyakran a virágzat ágait is megrágják, ezzel sokkal több virág pusztulását okozva.

### **Védekezés**

Kezelést a lárvakelés kezdetén, az első generáció gazdasági kárküszöbének elérésekor kell végezni:

- asztali szőlőfajták – 4-6 lárvá 100 virágzatra;
- borászati szőlőfajták – 6-8 lárvá 100 virágzatra.

## Kártevő – Szőlőpajzstetű **Pulvinaria vitis**

### **Kártétel**

Ebben az időszakban a áttelelt generáció lárvái és a kifejlett szőlőpajzstetvek okoznak kárt. Nedvet szívnak a hajtásokból, ami a szőlőtőkék gyengüléséhez vezet.

### **Védekezés**

A kémiai védekezést a fiatal lárvák ellen kell végezni az egyik bejegyzett növényvédő szerrel.

## Kártevő – **Sárga szőlőatka** *Schizotetranychus viticola* és **Vörös gyümölcsfa-atka** *Panonychus ulmi*

### **Kártétel**

Mindkét faj első és második generációjának imágói, lárvái, protonimfái és deutonimfái károsítanak, a levelek fonákjáról szívják nedvet, főként az fő- és mellékerek környékén csoportosulva.

### **Védekezés**

Kezelést az imágók és lárvák ellen kell végezni, amikor a gazdasági kárküszöb elérhető:

- 2-3 egyed/levél – május közepéig.

*Kártevő – Szőlő sodróormányos* *Byctiscus betulae*

## ***Kártétel***

A kifejlett rovarok károsítanak, először a rügyeket, később a leveleket és hajtásokat rágják. Petézés közben a nőtények a levelek levélnyelét vagy a fiatal hajtásokat rágnak meg, és a levelek hervadása után szivar alakba göngyölik azokat.

## **Védekezés**

Ha a kifejlett egyedek sűrűségének növekedését állapítják meg, kezelést kell végezni a petézés előtt érintkező rovarölő szerekkel.

A permetezést 10-14 nap múlva meg kell ismételni.