

Instabil időjárás és megnövekedett jégképződés valószínűsége május végén és június elején

Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.05.2021 Брой: 5/2021



A május végén és június elején a legtöbb napon az időjárási viszonyokat instabil időjárás és az átlagos napi hőmérsékletek alacsonyabbak lesznek, mint az erre az időszakra jellemző klímanormák.

Az ország számos részén agronómiai szempontból jelentős csapadék várható. A legkeletibb régiókban, ahol a talaj nedvességtartaléka az 50 cm-es rétegben május második felében volt a legalacsonyabb, helyenként a teljes vízkapacitás 65%-a alatt, mint például a szilveni és karnobati agrometeorológiai állomásokon, a nedvességtartalékok javulása és a mezőgazdasági növények fejlődési feltételeinek javulása várható. A következő időszak csapadéka kiemelten fontos lesz a téli gabonanövények számára, amelyekben a szemtöltés zajlik, és a déli régiókban – a tejérettségi fázis is. A szemtöltéstől a tejérettségig terjedő időszakban a búzának

komoly kárt okoznak a gabonapoloska lárvák, ami miatt szükséges a telepek monitorozása a kártevő jelenlétére, és ha a populációsűrűség meghaladja a 2 lárva/m² gazdasági kárküszöböt, a lehető legkorábban rovarirtó kezelést kell alkalmazni.

Az időszakban a kukoricában és a napraforgóban a levélképződés zajlik. Június elején csak a napraforgóállományok kis része, főként az agrotechnikai határidőn belül vetettek, lép be a virágzatképződés szakaszába.

Az időszak gyakori csapadéka megnehezíti a növényvédő permetezések végrehajtását és kedvező feltételeket teremt számos gombabetegség terjedéséhez: lisztharmat a zöldségnövényeken és a szőlőben, barna rothadás a korai cseresznyefajták termésén, szürkepenész az eperben, varasodás a gyümölcsfákon stb.

Május végén és június elején ismét megnövekedett jégesőveszély várható, amely komoly kárt okoz a mezőgazdasági növényekben és veszteséget az éppen érésben lévő gyümölcsösök termésében.

Emlékeztetünk, hogy tegnap egy pusztító jégeső megsemmisítette a mezőgazdasági termelést a Szopot és Karlovo községekhez tartozó több faluban. Előzetes becslések szerint a katasztrófa a termelés közel 70%-át tette tönkre. A termő szakaszban lévő rózságyások károsodása jelentős.

Forrás: OMSZ