

Agrometeorológiai előrejelzés júniusra

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.06.2021 Брой: 6/2021



Június első tíz napjában az agrometeorológiai viszonyokat instabil időjárás fogja meghatározni. A hónap elején jelentős csapadék várható, ami javítani fogja a talaj nedvességtartalékát az 50 és 100 cm-es talajrétegben. Az ország legnagyobb részén a tavaszi növények talajnedvesség-tartaléka eléri, a Duna-menti síkságon pedig még meghaladja is a 80-85%-os mezőkapacitást. Egyes keleti és déli régiókban, ahol májusban kevesebb csapadék hullott, helyenként a havi normálérték 50-60%-a alatt – G. Delchev, Szlivno, Szent István, Várna, Karnobát, Burgasz, Ahtopol – a talajnedvesség alacsonyabb marad.

Június elején a mezőgazdasági növények fejlődése lassabb ütemben fog zajlani, az évszakhoz képest hűvös időjárási viszonyok között. Az első tíz napban a búzában a szentöltődés és a tejérettség fázisa következik be. A tíz nap végén az árpa egyes déli régiókban, például a Szandanszkiban, már a viaszérettséget is eléri. A záporok

korlátozni fogják a permetezési lehetőségeket a szőlőben és a zöldségnövényekben a peronoszpóra, a gyümölcsfákon a varasodás és a barna rothadás, valamint a téli gabonanövényekben a poloska elleni növényvédelmi kezelések végrehajtását. Az időszak második felében továbbra is fennáll a jégeső és helyi csapadék valószínűsége, ami károsodás veszélyét hordozza a mezőgazdasági növényekre. A búza és árpa állományok fekvése miatti vetemedés kockázata magas.

A második tíz napban a hőmérsékleti viszonyok javulása és normalizálódása várható. Ebben a tíz napban az árpa befejezi fejlődését. A repcében az érési fázis következik be.

A harmadik tíz napban a mezőgazdasági növények fejlődése a klímai normákhoz közeli hőmérsékletek mellett fog zajlani. Ebben az időszakban a búzában a síkvidéki régiókban a viaszérlettség figyelhető meg.

Június végén a tavaszi növények egy része belép fejlődése reprodukzív szakaszába. A korai kukorica hibridjeinek a virágzása, az agrotechnikai határidőn belül vetett napraforgónak pedig a virágzás kezdete figyelhető meg.

A hónap legtöbb napján a magas légköri páratartalom kedvező feltételeket teremt számos gombabetegség – a gyümölcsfákon a varasodás, a lyukasfoltosság és a lisztharmat; a zöldségnövényekben és a szőlőben a peronoszpóra, stb. – fejlődéséhez. A szőlőben az inflorescencia virágzásától a borsó nagyságú bogyóképződésig tartó inter-fázis kritikus a peronoszpóra és a lisztharmat (oidium) fertőzés szempontjából. Az alapvető fontosságú növényvédelmi permetezések végrehajtására alkalmasabb feltételek június második tíz napjának első felében és a harmadik tíz napján állnak elő.

A hónap során a jégeső valószínűsége továbbra is megnövekedett marad. Jégkár esetén célszerű az érintett gyümölcs- és zöldségnövényeket a lehető legkorábban réztartalmú gombaölő szerekkel kezelni.

Forrás: OMSZ