

Június végén – magas hőmérséklet és helyi csapadék

Автор(и): Растителна защита
Дата: 29.06.2021 *Брой:* 6/2021



Június végén az agrometeorológiai viszonyokat meleg, egyes helyeken forró idő jellemzi. A mezőgazdasági növények fejlődése a vetésterületek nagy részén jó és nagyon jó nedvességtartalék mellett fog zajlani a 50 és 100 cm-es talajrétegben (a teljes víztartó képesség 80-85%-a felett), ami az elmúlt két hét jelentős csapadékmennyiségeinek köszönhető. Egyes helyeken Közép- és Kelet-Bulgáriában ez a júniusi normál érték akár a kétszeresét is elérte vagy meghaladta (Veliko Tarnovo – 118 l/m², Ruse – 115 l/m², Razgrad – 108 l/m², Silistra – 116 l/m², Dobrich – 111 l/m², Karnobat – 96 l/m²). Kivételt képeznek néhány távoli nyugati és déli régió, ahol a normál alatti csapadékot regisztráltak, és a nyár kezdetén a talaj nedvességtartaléka a 50 cm-es

rétegben a tavaszi növények számára kielégítetlen – a teljes víztartó képesség 65%-a alatti (agrometeorológiai állomások: Bazovets, Kyustendil, Sandanski, Haskovo, Sliven).

Az időszakban a napraforgó a virágzatképződés stádiumában lesz. Július elején, az agrotechnikai határidőn belül vetett, főként déli régiókbeli állományokban a virágzás kezdetét is megfigyelhetjük.

A kukoricában a levélképződés folytatódik. A korai hibridéknél a füzérképződés és a füzérvirágzás stádiuma figyelhető meg. Június végén és július elején a kukoricaállományokat át kell vizsgálni az egyik legfontosabb kártevő, a kukoricamoly jelenléte szempontjából, és ha a kártevő sűrűsége meghaladja a gazdasági károkküszöböt, időbeni kezelés elengedhetetlen.

A június utolsó hetére előrejelzett magas hőmérsékletek számos gombabetegség fejlődését korlátozzák, kivéve a lisztharmatokat.

A következő időszakban a búza befejezi fejlődését még a magasabban fekvő területeken is.

Az időszakban ismét helyi csapadék várható, fokozott valószínűséggel Kelet-Bulgáriában, ahol ez tovább akadályozhatja az aratási kampány megkezdését.

Forrás: NIMH