

A talajnedvesség hiánya augusztusban korlátozó tényező lesz a mezőgazdasági növények fejlődésében.

Автор(и):

Дата: 09.08.2021 Брой: 8/2021



A júliusi hosszú tartós hőség után, augusztus első napjaiban továbbra is a száraz és forró időjárás határozza meg az agrometeorológiai viszonyokat. A hónap elejére előrejelzett, 39-40°C feletti rendkívül magas maximumhőmérsékletek megzavarják a mezőgazdasági növények élettani folyamatainak normális lefolyását. Az ilyen nagyságrendű értékek, az alacsony levegő páratartalommal kombinálva, a késői szántóföldi termesztésű zöldségféléknél terméketlenséget okoznak.

Augusztus elején a kukorica hibridfajták korai érésétől függően a tej-, viasz- és teljes érés fenofázisai figyelhetők meg. A napraforgónál a magfejlődés és az érés fázisai zajlanak le. A szőlőben a bogyók színeződése és megpuhulása figyelhető meg. Az ország számos régiójában a talajnedvesség hiánya miatt a talajművelési lehetőségek korlátozottak lesznek. Célszerű a búza és árpa betakarítását követő területeken szárbontást végezni a gyomvegetáció megsemmisítése, a talaj kapillárisainak feltörése és a talajnedvesség megőrzése érdekében. A növényvédő permetezések végrehajtásának feltételei a zöldségfélékben és a gyümölcsültetvényekben főként a reggeli, hűvösebb órákban lesznek adottak. A jégverés és a mezőgazdasági növények károsodásának valószínűsége továbbra is fennáll.

Augusztusban a késői mezőgazdasági növények fejlődésének korlátozó tényezője a talajnedvesség hiánya lesz. A hónap során előrejelzett, az átlag alatti csapadékmennyiség, a július végén kialakult aszály háttérében, nem lesz különösebb gazdasági jelentőségű, ami megnövelt öntözési adagok alkalmazását teszi szükségessé a késői mezőgazdasági növényeknél. Augusztus elején magasabb öntözési adagra lesz szükség a második növény és a későbbi kukoricahibridek esetében, amelyekben a szemképződés és -töltődés zajlik, valamint a későbbi gyümölcstermő fajtáknál és szőlőben, amelyek a termésnövekedés folyamatában vannak.

A hónapra előrejelzett, az átlag feletti hőmérsékleti viszonyok a késői szántóföldi növények fejlődésének interfázisainak lerövidüléséhez vezetnek. Az első tíz napban a korai kukoricahibridek egy része befejezi fejlődését, a középkoraiaknál pedig a tejérés fázisa figyelhető meg. A napraforgónál a Duna-menti síkságon és a déli régiókban az érés fázisa zajlik le. A második tíz nap közepén a szántóföldi területek napraforgó állományainak nagy része technikai érettségbe lép. A harmadik tíz napban a középkéső kukoricahibrideknél a viaszérés lesz túlsúlyban, a szójababnál pedig az érés fázisa.

Az augusztusi meteorológiai viszonyok számos gombabetegség fejlődését korlátozzák, kivéve a lisztharmatot a zöldségfélékben, a késői gyümölcstermő fajtákban és a szőlőben. A hónap során a növényvédő permetezéseket a nap hűvösebb óráiban, a növények érési idejéhez igazodó, megfelelő betakarítás előtti időtartammal rendelkező szerekkel kell végezni.

Augusztusban az ország szántóföldi régióinak számos helyén a száraz és tömörödött talaj megnehezíti a téli repce vetésére szánt területek mélyszántásának és vetés előtti talajművelésének minőségi elvégzését.