

Július közepén – forró és száraz idő

Автор(и): Растителна защита
Дата: 23.07.2022 Брой: 7/2022



Július második tíz napos időszakában az ország szántóterületein nem esett mezőgazdasági szempontból jelentős csapadék. Ez tovább mélyítette a talajvízkészlet hiányát a méterenkénti rétegben Nyugat- és Dél-Közép-Bulgáriában.

Július végén a mezőgazdasági meteorológiai viszonyokat a forró és száraz időjárás fogja meghatározni. A normál feletti hőmérséklet, amely helyenként eléri és meghaladja a 35°C-ot, sőt egyes helyeken a 40°C-ot is, megzavarja a fiziológiai folyamatok normális lefolyását, és a mezőgazdasági növények fejlődési szakaszai közötti időtartam lerövidüléséhez vezet. Az időszak alatt a kukorica – az egyes hibridek vegetációs időtartamától függően – a virágzás, a selymes fonalak megjelenése, a szemek kialakulása, valamint a Duna-síkság egyes területein (Kneja, Novachene és Szilisztra agrometeorológiai állomások) a tejérettség fázisaiban lesz.

A napraforgónál a virágzás, a magok kialakulása és a tömeges betöltődés zajlik majd. Az időszak forró és száraz időjárása megnövelt öntözési mennyiségek alkalmazását teszi szükségessé a zöldségfélék és a kukorica esetében.

Az időszak alatt a szántóterületek számos pontján a művelőréteg nedvességhiánya akadályozni és késleltetni fogja a szezonális talajművelési munkák megfelelő végrehajtását.

A többéves kultúrákban és a zöldségfélékben folytatódik a növényvédő permetezés betegségek és kártevők ellen – lisztharmat és a szőlőmoly ellen a szőlőültetvényekben, lisztharmat, gyümölcsférgek és atkák ellen a gyümölcsfajtáknál, valamint lisztharmat és atkák ellen a zöldségféléknél. Vegyszeres védekezés során rövid aratás előtti várakozási idővel rendelkező termékeket kell alkalmazni, a nap hűvösebb óráiban.

Forrás: NIMH