

Augusztus – talajnedvesség-hiány és a normál feletti hőmérsékleti viszonyok

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.08.2022 Брой: 8/2022



Augusztus nagy részében az agrometeorológiai viszonyokat a viszonylag száraz és forró időjárás fogja meghatározni. A hónap folyamán a talajnedvesség hiánya korlátozó tényező lesz a késői mezőgazdasági növények fejlődésében.

Július végén, a normál alatti csapadék következtében, a vetőterületek nagy részén a tavaszi növények alatti 50 cm-es talajrétegben a termelő nedvesség kimerült, a 100 cm-es rétegben pedig kevés, a mező vízkapacitásának 50%-a alatti volt. A déli régiók egyes helyein (Pazardzsik, Ljubimec, Szliven agrometeorológiai állomások) a termelő nedvesség hiányzott még az egyméteres talajrétegben is.

Augusztus első tíz napjában nem várható agronómiai jelentőségű csapadék, ami a későbbi kukorica hibridek öntözési normáinak növelését teszi szükségessé, amelyek a szemképződés és a szemtöltődés stádiumaiban vannak. Magasabb öntözési normákra lesz szükség a zöldségfélék és a gyümölcsfák őszi fajtái számára is, amelyek a hónap folyamán intenzív gyümölcshajtáson mennek keresztül.

Az augusztusi napok nagy részére előrejelzett normál feletti hőmérsékleti viszonyok a késői mezőgazdasági növények fejlődésének fázisai közötti időszakok lerövidüléséhez vezetnek. A hónap folyamán a kukoricában különböző érési stádiumok következnek be. Az első tíz napban a korábbi hibridek fejlődése befejeződik, míg a középkoraiak a tejérettség stádiumában lesznek. A harmadik tíz nap végén a középkéső kukorica hibrideknél a viaszérettség lesz túlnyomó. A vetőterületeken a napraforgó tömeges érési stádiuma a hónap közepén figyelhető meg.

Augusztusban az előrejelzett, 35-40°C közötti maximum hőmérsékletek negatívan befolyásolják a késői termelésű második növények (uborka, zöldbab, cukkini) virágzását és termékenyülését.

A hónap napjainak nagy részén uralkodó száraz időjárás korlátozni fogja számos gombabetegség terjedését, kivéve a lisztharmatot a gyümölcs- és zöldségfélékben.

Augusztusban a gyümölcsmolyok utolsó nemzedékének károsító tevékenységét nem szabad alábecsülni a gyümölcsfák késői fajtáinál. A hónap viszonyai kedvezőek lesznek a atkák egyedszámának növekedéséhez. A szőlőültetvényekben figyelemmel kell kísérni a szőlőmoly harmadik nemzedékének hernyóinak megjelenését és sűrűségét. A hónap folyamán a növényvédő kezeléseket a nap hűvösebb óráiban, a növények érési idejéhez igazodó, megfelelő aratás előtti várakozási idővel rendelkező szerekkel kell végezni.

Forrás: OMSZ