

Szeptemberben – megfelelő nedvességtartalék és megfelelő feltételek a szezonális mezei munkák elvégzéséhez

Автор(и): Растителна защита

Дата: 01.09.2022 Брой: 9/2022



Szeptember első dekádjának első felében az agrometeorológiai viszonyok továbbra is instabilak maradnak, gyakori csapadékkal, amely a legtöbb szántóföldi területen megőrzi a jó nedvességtartalékot a talaj felső rétegeiben. Az augusztus harmadik dekádjában lehullott elterjedt csapadék, amely az ország számos részén meghaladta a 30-40 l/m²-t (Lom - 44 l/m², Oriahovo - 54 l/m², Knezsa - 53 l/m², Plovdiv - 36 l/m², Kardzsali - 72 l/m², Csirpan - 67 l/m², Ahtopol - 60 l/m²), megnövelte a talaj nedvességtartalékát az 50 cm-es rétegben. Ez a csapadék későn érkezett a tavaszi esőzőltetvényes kultúrák egy részéhez, amelyek a talajnedvesség-hiány következtében idő előtt befejezték vegetációjukat.

Szeptember első és a második dekád napjainak nagy részén a nyári aszály kedvezőtlen hatásait legyőző késői mezőgazdasági kultúrák fejlődése felgyorsult ütemben fog folytatódni, a klímái normák körüli és feletti hőmérsékletek mellett. Szeptember elején a középkeső kukoricahibridek fejlődése befejeződik. A késői hibrideknél a tejérlelési, a hónap közepétől pedig a zsíréreleési fázis figyelhető meg.

A második dekád kezdetén ismét csapadék várható, és megnövekedett kockázatot jelentenek az érett és érésben lévő gyümölcs- és szőlőtermés penészfertőzését okozó kórokozók: a szürkepenész a szőlőben, a késői barna rothadás az őszi-téli gyümölcsfajták termésén.

A hónap folyamán viszonylag száraz időjárású, a szezonális mezőgazdasági munkák (napraforgó és korábbi kukoricahibridek betakarítása, a téli gabonák vetésére előkészített területek mélyszántása és vetés előtti talajművelése, valamint a téli repce vetése) végzéséhez kedvezőbb feltételek az első dekád második felében és a második dekád napjainak nagy részében várhatók. Szeptember második dekádjának végéig érvényesek a repce vetésére vonatkozó agrotechnikai optimális időkorlátok.

Szeptember harmadik dekádjában az időjárás stabilizálódását, a hőmérsékletek jelentős csökkenését, valamint a nyár végére és az ősz kezdetére jellemző átmeneti agrometeorológiai változásokat jósolják. Ebben az időszakban várható csapadék biztosítja a nedvességet az agrotechnikai határidőn belül bevetett téli repce állományok normális keléséhez.

A kelési fázisban a repcét a káposztabolha (imágó) és a repcelevelező darázs (álhernyó) károsítja, ami megköveteli, hogy a felkelt állományokat e kártevők jelenléte szempontjából megfigyeljék, és ha sűrűségük meghaladja a gazdasági kárküszöböt (a káposztabolha esetében - 2 bogár/m²; a repcelevelező darázs esetében - 2-3 álhernyó/m²), időben végezzenek kezelést.

Szeptember végéig nem várhatóak fagyok a szántóföldi területeken, ami feltételeket biztosít a késői szántóföldi termesztésű zöldségfélék további terméshozamának kialakulásához.

Forrás: OMSZ