

Szeptember végén és október elején kedvezőek lesznek a körülmények a még be nem takarított termésben a rothadást okozó kórokozók fejlődéséhez.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.09.2022 Брой: 9/2022



Szeptemberben a déli régiók egyes helyein (Haskovo, Pazardzsis, Csirpan, Karnobat, Plovdiv, Szandanszki, Szliven, Burgasz) gazdaságilag jelentős, 15–20 l/m² közötti csapadék hullott, amely biztosította a szükséges nedvességet az agrotechnikai határidőn belül vetett tépirapocsnak a keléséhez.

A hónap végén agrometeorológiai viszonyok javulása várható. Az időszak alatt a késői kukoricahibridek befejezik fejlődésüket és teljes érettségi állapotba lépnek. A késői gyümölcsfajtáknál és szőlőültetvényeken az

érés folyamatok a klímanorma körüli hőmérsékletek mellett folytatódnak.

Az időszak alatt nem várható jelentős csapadék, és a feltételek lehetővé teszik a késői tavaszi növények betakarításának befejezését, a búzával és árpa vetésére szánt területek vetés előtti művelését, valamint a műtrágyák kijuttatását. Az időszak alatt kezdődik a tépi gabonanövények vetésének agrotechnikai határideje a magasföldeken és az Elő-Balkánon. Szeptember végéig a feltételek lehetővé teszik a tépirapocsnak vetésében bekövetkezett késések felzárkózását. Az időszak alkalmas a spenót őszi vetésére és az új eper ültetvények létesítésére.

Az időszak elején a medencei mezők egyes elszigetelt helyein nem zárható ki a fagy kialakulásának lehetősége, ami a fagykárosodásra érzékeny termés időben történő betakarítását igényli.

Október első hetében az agrometeorológiai viszonyokat instabil időjárás, az időszak második felében pedig a normál alatti hőmérsékletek is jellemezni fogják. Az október első hetében előrejelzett csapadék késleltetni fogja a késői tömeges növények területeinek kiürítését. Az első évtized közepén uralkodó nedves és hűvös időjárás előfeltétel lesz a rothadást okozó kórokozók – szürke penész a késői borászati szőlőfajták még betakarítatlan termésén, valamint késői barna rothadás az őszi-téli gyümölcsfajták termésén – fejlődéséhez.

A szeptember végén az északnyugati régiókban, az északkeleti régiók egy részében és a szófiai mezőn hullott, 20–30 l/m² közötti csapadék (N. selo, Vidin, Lom, Orjahovo, Szófia, V. Tarnovo, Dobrics) növelte a nedvességtartalékot a talaj felső rétegeiben. A következő időszakban Nyugat-Bulgáriában és a központi régiókban ismét helyi, intenzív csapadék valószínűsége várható, amely akadályozni fogja az őszi növények vetésére szánt területek vetés előtti művelésének végrehajtását. Komoly késések várhatók a tépirapocsnak vetésében. A nyár végi és ősz eleji kedvezőtlen agrometeorológiai viszonyok, az aszály és az azt követő intenzív csapadékok az oka annak, hogy a síkvidéki régiók számos helyén szeptemberben elmulasztották a pontos agrotechnikát igénylő növény, a repcse vetésének agrotechnikai határidejét. Október elején kezdődik a búza vetésének agrotechnikai határideje Észak-Bulgáriában.

Forrás: NIMH