

Agrometeorológiai előrejelzés októberre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 12.10.2022 Брой: 10/2022



Októberben dinamikus agrometeorológiai viszonyok várhatók, a hőmérsékletek a klimatikus normákhoz közelednek, a csapadék pedig a havi normák feletti lesz.

Október első napjaiban az évszakhoz képest szokatlanul magas hőmérsékletek várhatók, ami feltételeket teremt a késői zöldségfélék további termésének kialakulásához, valamint a gyümölcsfák őszi fajtáinak és a késői szőlőfajtáknak a gyümölcsseiben a cukortartalom növekedéséhez.

A normál feletti hőmérsékleteket követően az első évtized második felében rövid távú lehűlés és a hőmérsékleti viszonyok normalizálódása várható.

Október első évtizedében jelentős csapadék várható, ami tovább nehezíti a szezonális agrotechnikai teendők elvégzését. A vetés előtti talajművelés és az őszi gabonák vetésének kedvezőbb feltételei a második évtized első felében, valamint a harmadik évtized legtöbb napján várhatók.

Az aszály, majd a nyár végén és az ősz elején bekövetkezett jelentős, helyenként intenzív csapadékok miatt kimaradtak az optimális vetési időpontok szeptemberben az őszi repce számára. A tervezett területek jelentős részét októberben, az agrotechnikai határidők után fogják bevetni. Ezen objektív okok miatt valószínű, hogy a későn bevetett repceállomány nem fogja tudni kifejleszteni a rozettát (7–8 levél) őszi vegetációja során – ebben a fázisban a növények sikeresen áttelelnék.

Október az optimális időszak az őszi gabonafélék vetésének. Az első évtized az agrotechnikai határidő a búza vetésére Észak-Bulgáriában, október 15. és 25. között – Dél-Bulgáriában, a hónap végén pedig – a Fekete-tenger menti területeken.

A hónap során a bevetett őszi növények vegetációjának kezdeti szakaszai mérsékelt ütemben fognak zajlani, tekintettel a felső talajrétegek jó nedvességtartalékára. Október végén a búzában a vetési időpontoktól függően a kelés és a harmadik levél stádiumok figyelhetők meg. A legkorábban, szeptember végén és október elején bevetett állományokban a szárazság kezdeti stádiuma is megfigyelhető. A repcében a levélképzés dominál.

Az októberre előrejelzett, a normához közeli hőmérsékleti viszonyok előfeltételei a mezei pocok – az egyik veszélyes kártevő az őszi növényekben – egyedszámának növekedésének. A hónap végéig meg kell vizsgálni az őszi állományokat a kártevő jelenléte szempontjából, és ha sűrűsége meghaladja a gazdasági károkozószórt (2 aktív kolónia holdanként), időben el kell végezni a növényvédelmi intézkedéseket (mérgezett csalétket kell elhelyezni a kolóniák bejáratainál).

Október végén a viszonyok lehetővé teszik egyes fitoszomatikus tevékenységek végrehajtását a gyümölcsösökben. A varasodással érintett alma- és körteültetvényeket a betakarítás után 5%-os karbamid-oldattal kell kezelni a fertőzés csökkentése érdekében. A csonthéjas gyümölcsfajoknál a tömeges levélhullás után 2%-os bordói-lé permetezését javasoljuk a lyukasfoltosság, a korai barna rothadás és az őszibarack levélhajlító gombák ellen.

