

# Október harmadik tíz napja – az őszi növényállomány fejlődésének korlátozó tényezője a felső talajrétegek nedvességhiánya lesz.

Автор(и): Растителна защита  
Дата: 25.10.2022 Брой: 10/2022



Október harmadik tíz napos időszakának első felében továbbra is a száraz időjárás és a klímánormákat meghaladó hőmérsékletek határozzák meg az agrometeorológiai viszonyokat.

A hónap elején bevetett búza- és árpaállományokban a csírázás, a kelés (Novachene és Pavlikeni agrometeorológiai állomások) és a levélképzés megkezdődése, a téli repcében pedig a levélképzés folyamata zajlik. Az ország számos régiójában az őszi növények állományainak fejlődését korlátozó tényező a felső

talajrétegek nedvességhiánya lesz. Az időszak második felében kezdődnek meg a téli gabonanövények vetésének optimális agrotechnikai időkeretei a Fekete-tenger mentén.

A művelőréteg talajnedvesség-tartalékainak hiánya hátráltatja a tarlók mélyszántásának, a vetés előtti talajművelésnek, valamint a búza és árpa vetésének megfelelő végrehajtását.

Az időjárás kedvező lesz a téli gabonaállományok felméréséhez bizonyos kártevők – mezei pocok, gabonalevélbogár, gabonalegyek és levéltetvek – előfordulása és kártétele szempontjából. Különös figyelmet kell fordítani azokra a területekre, ahol monokultúras termesztést alkalmaznak.

A feltételek kedvezőek lesznek a fitoszaintári tevékenységek végrehajtásához állandó növényállományokban – az aszott ágak és az aszalványtermések eltávolítása, a régi és repedezett kéreg kaparása, valamint a varasodással érintett almafélék kezelése 5%-os karbamid-oldattal a fertőzés korlátozása érdekében.

*Forrás: OMSZ*