

Agrometeorológiai előrejelzés novemberre

Автор(и): Растителна защита
Дата: 04.11.2022 Брой: 11/2022



November első felében az agrometeorológiai viszonyokat száraz időjárás és a klímai normák feletti hőmérsékletek határozzák majd meg. A hónap közepéig a vetett őszi növények fejlődésének korlátozó tényezője továbbra is a talajnedvesség hiánya marad. A déli és délkeleti régiók egyes részein (Karnobat agrometeorológiai állomás) a kialakult aszály kétségesse teszi a kicsírázott és felbukkant növények egy részének túlélését.

Október végén a talajnedvesség-tartalék szintje a 50 és 100 cm-es rétegben szokatlanul alacsony volt, Dél-Bulgária számos helyén – a mezővízkapacitás 40%-a alatt (agrometeorológiai állomások: Plovdiv, Pazardzhik, Szliven). A délkeleti régiók egyes részein (Karnobat agrometeorológiai állomás) az egész egy méteres talajrétegben nem volt nedvesség.

November elején az aszály korlátozni fogja a szezonális talajművelés végrehajtását, és a vetésterületek egy részében az őszi gabonanövények vetését az agrotechnikai határidők után halasztja.

November második felében az agrometeorológiai viszonyok változásnak indulnak. A második évtized közepétől a harmadik évtized közepéig csapadékot, valamint a talajnedvesség-tartalékok javulását jósolják a felső rétegekben és a vetett őszi növények vegetációjának kezdeti szakaszaihoz szükséges feltételekben. Ebben az időszakban az őszi gabonanövények fejlődése a hónap második felére jellemző klímai normákhoz közeli napi átlaghőmérsékletek mellett zajlik majd.

November végén a búza és az árpa a kicsírázás, valamint az 1., 2. és 3. levél képződésének fázisaiban lesz. A növények egy kis részénél, a Duna-síkság régióinak bizonyos helyein (agrometeorológiai állomások: Bazovec, Novacsene, Ruszé környéke), ahol az őszi eleji helyi csapadék biztosította a nedvességet az őszi gabonanövények kezdeti vegetációjához, a szárhasadás fázisa is megfigyelhető lesz.

A hónap során nem jósolnak kritikus minimumhőmérsékleteket a felbukkant őszi növények számára. November elején folytatni kell a növények kártevők – búzalevél-fúró, gabonalegyek – jelenlétére történő ellenőrzését, és ahol ezek sűrűsége meghaladja a gazdasági károshatási küszöbértéket (a gabonalegyek esetében a GKK 3–4 db/m², a búzalevél-fúró esetében – 3 lárva/m² felett), ott időben el kell végezni a kezelést.

Kedvező feltételek az őszi növényvédő permetezéshez a gyümölcsösökben a varasodás, a korai barna rothadás, a lyukasfoltosság, az őszibarack levélhajlása és egyéb telelő kórokozók fertőzéseinek korlátozására november első felében, a gyümölcsfák ültetésére pedig a harmadik évtizedben állnak majd elő.

Forrás: NIMH