

December – figyeljen az évelő növények fitoszomatikus tevékenységeire

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.12.2022 Брой: 12/2022



December legtöbb napján a dinamikus időjárás határozza meg az agrometeorológiai viszonyokat, rövid időszakok váltakozásával, amikor az átlagos napi hőmérsékletek a klimatikus normák körül, alatt és felett mozognak.

A hónap elején a felső talajrétegek megnövekedett nedvességtartalma korlátozni fogja a szezonális talajművelés végrehajtását. Az időszak közepén nem várható csapadék, ami lehetőséget nyújt a fitoszerviz tevékenységek végrehajtására a tartós növényállományokban.

A november végén bekövetkezett lehűlés lassuláshoz, a magasabb mezőkön és az Elő-Balkánon, ahol hóréteg alakult ki, pedig a vegetatív folyamatok leállításához vezetett az őszi vetésű növényekben.

December elején hőmérséklet-emelkedés várható, de átlagos napi értékeik, Dél-Bulgária és a Fekete-tenger partvidékének néhány helyétől eltekintve, nem haladják meg a téli gabonanövények vegetációjához szükséges biológiai minimumot.

A hónap folyamán az ország legnagyobb részén az őszi vetésű növények relatív nyugalmi állapotban maradnak. Kivételek ismét a déli és délkeleti régiók növényállományaiban figyelhetők meg az első évtized végén és a második évtized első felében. Ebben az időszakban a normál feletti hőmérsékletek várhatók, maximum értékekkel 10–12°C felett, és feltételek a késleltetett vegetációra a téli gabonanövényekben, de a növényállomány fenológiai állapotának megváltozása nem valószínű.

Idén a búzanövények jelentős része fejlettségének kezdeti szakaszában telel át. Az őszi félév első felében tartó szárazság az ország legnagyobb részén korlátozta és késleltette a téli gabonanövények vegetációját. Ezen objektív ok miatt a növényállományok különböző fenológiai fázisokban lépnek a télbe: csírázás, 1–2–3 levél, és a szárhasadás kezdete. Csak a búzanövények kis része van a szárhasadás fázisában, amelyben a növényállományok a legjobban ellenállnak a téli viszonyoknak, a Duna-síkság egyes helyein – a Novachene agrometeorológiai állomás és a Ruse-i régió területén.

Decemberben a várt minimum hőmérsékletek, akár mínusz 9–10°C-ig, hóréteg nélküli körülmények között és hosszabb ideig tartóan, kockázatot jelentenek a kicsírázott, de még nem megedzett téli gabonanövények számára.

A hónap folyamán várható, a norma körüli és feletti csapadék növelni fogja a nedvességtartalékok szintjét a 50 és 100 cm-es talajrétegben. A november második felében elterjedt csapadék után, amely az ország számos részén meghaladta a 40–50 l/m²-t, az őszi vetésű növények nedvességhiánya megszűnt.

Forrás: NIMH