

A hőmérséklet csökkenése visszafogja a korai fejlődést a gyümölcsstermesztésben.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 23.01.2023 Брой: 1/2023



A január második tíz napos periódusának végén szokatlanul magas, az ország számos részén 18-19°C-ot, egyes területeken (Vidin, Knezha, Lovech, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Plovdiv, Pazardzhik) akár 20-22°C-ot is elérő hőmérsékletek a őszi vetésű növények vegetatív folyamatainak aktiválódásához vezettek. A január havi normál feletti hőmérsékletek megbontották a gyümölcstermő növények téli nyugalmi állapotát. Az ország mezőgazdasági területein a csonthéjas gyümölcsfajoknál (mandula, kajszi, őszibarack, cseresznye) tömeges rügyduzzadást regisztráltak.

A következő hétnapos időszakban az agrometeorológiai viszonyok változásnak indulnak, amely jelentős mértékű lesz az időszak második felében. A várható hőmérséklet-csökkenés visszafogja a gyümölcstermő

növények nemkívánatos, idő előtti fejlődését és téli keménységük csökkenését.

Az időszakban a legtöbb mezőgazdasági régióban az előrejelzett napi átlaghőmérsékletek közeliek lesznek a téli gabonanövények vegetációjához szükséges biológiai minimumhoz. Kivételt képeznek a keleti régiók, ahol a harmadik tíz napos periódus elején magasabb hőmérsékletek várhatók, és feltételek alakulnak ki az őszi vetésű növények vegetatív folyamatainak folytatásához.

Január végére a téli gabonanövények a harmadik levél és a szárazság növekedési stádiumaiban lesznek, főként a Duna-menti síkság és a délnyugati régiók egyes részein található állományokban. Az időszak alatt nem várhatók a telettetésre szánt mezőgazdasági növényekre kritikus minimumhőmérsékletek.