

Február – helyreállítja az őszi vetésű növények téli nyugalmi állapotát és megállítja néhány csonthéjas gyümölcsfaj fejlődését.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 05.02.2023 Брой: 2/2023



A január végi hidegidőszak, amely a szezonra nézve szokatlanul magas hőmérsékleteket követően érkezett, visszaállította az őszi vetésű növények nyugalmi állapotát, és megakadályozta egyes csonthéjas gyümölcsfajok korai fejlődését.

Februárban az agrometeorológiai viszonyok egyre dinamikusabbá válnak. Az első tíz nap legtöbb napján az átlagnál alacsonyabb hőmérsékletek határozzák meg őket, de a túlélő mezőgazdasági növények számára

kritikus minimumértékek nélkül. Az ország legnagyobb részén, a délkeleti régiók és a Fekete-tenger partvidéke kivételével, hóesést, hótakaró képződést és az őszi vetésű növények áttelelési feltételeinek javulását jósolják.

A második tíz nap kezdetén felmelegedésre és az agrometeorológiai viszonyok változására számíthatunk. A február végéig előrejelzett hőmérsékletek a legtöbb termesztési területen a klimatikus normák közelében lesznek, és a téli gabonanövények nyugalmi állapotát tartják fenn. Kivételek ismét a déli régiókban és a Fekete-tenger partvonalán várhatók. Ezekben a régiókban a második tíz nap alatt az átlagos napi értékek az őszi vetésű növények vegetatív folyamatainak újraindításához szükséges biológiai minimum körül és felett lesznek. Február végére a búzaállományok a harmadik levél és a szárazás növekedési stádiumaiban lesznek.

A hónap során a prognosztizált minimum hőmérsékletek, mínusz 12-13°C tartományban, a szárazási stádiumba lépett téli gabonanövények kritikus küszöbértékei felett vannak. Ezek az értékek, hótakaró nélküli körülmények között, kockázatot jelentenek a harmadik levél stádiumában áttelelő állományokra (agrometeorológiai állomások: Kneja, Targovishte, Kyustendil, Pazardzhik, Chirpan, Sliven, Yambol, Dolni Chiflik).

A februárra várható csapadék, a klimatikus normák körül és felett, növelni fogja a talaj nedvességtartalmát az egy- és kétméteres rétegekben. A január második és harmadik tíz napján jelentkezett jelentős csapadék, az ország számos helyén 60-70 l/m² felett, és néhány déli régióban – 120-130 l/m² felett (Haskovo-165 l/m², Kardzhali-214 l/m², Chirpan-133 l/m², Stara Zagora-144 l/m²), élesen megnövelte a téli gabonanövények nedvességtartalmának szintjét. A termesztési területek nagy részén az őszi vetésű növények teljes víztartaléka az egy méteres talajrétegben meghaladta a TKN (tározó kapacitás) 90%-át.

Februárban a második tíz nap alatt alakulnak ki alkalmasabb körülmények a metszésre szőlőkben és gyümölcsösökben, valamint a téli növényvédő permetezések elvégzésére gyümölcsösökben. A hónap során gyakori csapadék a felső talajrétegeket vízzel telített állapotban tartja, ami akadályozni fogja az őszi vetésű növények nitrogén tartalmú ásványi trágyákkal történő utántrágyázását, valamint a korai tavaszi növények (borsó, búkköny, zab, tavaszi árpa) vetésére szánt területek elővetési talajművelését.

Forrás: OMSZ