

Agrometeorológiai előrejelzés márciusra

Автор(и): Растителна защита
Дата: 14.03.2023 Брой: 3/2023



A február második felében bekövetkezett klímaváltozások, a szezonra szokatlanul magas, sok alföldi területen 21-22°C-ot meghaladó napi maximumhőmérsékletek (Knezha - 24°C, Lovech - 23°C, Pleven - 23°C, Plovdiv - 23°C, Chirpan - 23°C) a őszi vetésű növények vegetációs folyamatainak aktiválódásához és a gyümölcsfák korai fejlődéséhez vezettek.

Március első tíz napjában csak Dél-Bulgária egyes helyein – Plovdivban, Pazardzhikban, Sandanskiban, Kardzhaliban és Haskovóban – mértek gazdaságilag jelentős, 20-30 l/m² közötti csapadékot, ami javította a talaj nedvességtartalékát az őszi vetésű növényekben.

A középső és keleti régiókban a hőmérséklet a klimatikus normák felett, valamint a téli gabonanövények vegetációjához szükséges biológiai minimum felett volt.

Az ország alföldi területein a második tíz nap legtöbb napján az időszakra jellemzőhöz közeli hőmérsékletek, valamint a téli gabonanövények késleltetett vegetációjához vezető feltételek várhatók.

A harmadik tíz nap első felében hőmérséklet-emelkedés és az őszi vetésű növények valamint a többéves ültetvények vegetációs folyamatainak aktiválódása várható. Március végén a búza és az árpa fejlődésében a szárhasadás dominál.

A hónap folyamán a gyümölcstermő növények különböző fejlődési stádiumokon mennek keresztül – a gyümölcscrügyek duzzadásától és bimbótörésétől a zöld rügyállapoton át a virágzáson és terméskötődésig a korai virágzású csonthéjas gyümölcsfajoknál (mandula, sárgabarack, őszibarack).

Márciusban mínusz 5-10°C közötti minimumhőmérsékletek várhatók – ezek kritikus értékek a gyümölcsfák virágai és fiatal terméskötődései számára.

A hónapban várható, a normát megközelítő vagy azt meghaladó csapadék növelni fogja a talaj nedvességtartalmát a 100 cm-es rétegben. A februárban a normál alatti csapadék következtében a legdélebbi és délkeleti régiókban a téli gabonanövények 50 és 100 cm-es talajrétegében a nedvességtarték szintje a szezonra szokatlanul alacsony volt – egyes helyeken a teljes vízkapacitás 55%-a alatt (agrometeorológiai állomások: Szliven, Chirpan).

Márciusban a előrejelzett dinamikus időjárás, a gyakori csapadékkal, hátráltatni fogja a szezonális agrotechnikai tevékenységek végrehajtását. Kedvezőbb feltételek a gyümölcsfák virágzás előtti növényvédő permetezésének végrehajtásához az első tíz nap második felében állnak elő. A hónap folyamán a felső talajrétegek megnövekedett nedvességtartalma korlátozni fogja az elővető talajművelés végrehajtását a korai és közepesen korai tavaszi növények vetésére szánt területeken. Emiatt valószínű, hogy a déli régiókban kimarad a napraforgó optimális vetési időszaka.

Március közepén kezdődik a napraforgó vetésének agrotechnikai időszaka (március 15-20.) Dél-Bulgáriában, a harmadik tíz nap közepén (március 25. – április 5.) pedig a Duna-menti síkságon.

Arról, hogy hol és mikor lesznek az ország különböző régióiban feltételek a növényvédő tevékenységek végrehajtásához, [ITT](#) tájékozódhat.

Forrás: NIMH