

Agrometeorológiai előrejelzés áprilisra – kedvező feltételek a gombabetegségek fejlődéséhez gyümölcsfákon

Автор(и): Растителна защита

Дата: 03.04.2023 Брой: 4/2023



Április első tíz napjában az agrometeorológiai viszonyokat instabil időjárás, gyakori csapadék fogja meghatározni, ami javítani fogja a talaj nedvességtartalékát, valamint a téli gabonák és a bevetett tavaszi növények fejlődési feltételeit. A március utolsó napjaiban hullott csapadék növelte a nedvességtartalékot a talaj felső rétegében. A tavaszi vegetációs időszak elején a havas telek és a februárban a normál alatti csapadék következtében a téli gabonák 50 cm-es és 100 cm-es talajrétegeiben a nedvességtartalékok évszakhoz képest kielégítőtlenek voltak, különösen néhány keleti és déli régióban, ahol a nedvességtartalék szintje a TNT (Téli Nedvességtartalom) 65%-a alatt volt.

Április első felében a mezőgazdasági növények fejlődése mérsékelt ütemben fog haladni, a klímai normákhoz közeli hőmérsékletek mellett. Az első tíz nap közepén rövid távú, jelentős hőmérséklet-csökkenés várható, a minimum értékek mínusz 2-3°C-ig süllyedhetnek, ami hosszabb ideig tartó esetben kritikus lehet a gyümölcsfák virágzása és fiatal terméskötődése szempontjából. Az első tíz napban a búza a Duna-menti síkságon és a déli régiókban a szárhasítás, a szárhosszabbodásba való átmenet és a szárhosszabbodás stádiumaiban lesz.

Április második felére jelentős hőmérsékleti javulás és a mezőgazdasági növények vegetációjának felgyorsulása várható.

A második tíz nap végén és a harmadik tíz nap elején várható csapadék jó szinten fogja tartani a nedvességtartalékot a 50 cm-es rétegben – ez kiemelten fontos a búza és az árpa számára, amelyekben a tömeges szárhosszabbodás és a kalászszemzésbe való átmenet stádiuma következik be – olyan fejlődési szakaszok, amikor a téli gabonanövények vízigénye a talajnedvességből meredeken megnő. Április végén a Duna-menti síkság néhány legkorábban szárhosszabbodó vetésében megfigyelhető lesz a kalászszemzés stádiuma (Novachene, Szilisztra agrometeorológiai állomás). A szárhosszabbodás és a kalászszemzés közötti időszakban a búzavetéseket rendszeresen felügyelni kell bizonyos kártevők megjelenése és károsító tevékenysége szempontjából: a gabonalevélbogár, a búzatripsz, a gabonapoloska esetében, és ha a kártevők sűrűsége meghaladja a gazdasági kárküszöböt, időben el kell végezni a kezelést.

A mezőgazdasági területeken a harmadik tíz nap elején a talaj hőmérséklete a 10 cm-es rétegben eléri a gabonakukorica vetéséhez megfelelő értékeket, a hónap végére pedig a hőkedvelő tavaszi növények (gyapot, bab, földimogyoró, görögdinnye, sárgadinnye stb.) vetéséhez is.

Az áprilisban várható gyakori csapadék kedvező feltételeket teremt a gyümölcsfák gombás betegségeinek (virágrothadás, lyukaslevelűség, varasodás stb.) kialakulásához. A növényvédő permetezések végrehajtásához alkalmasabb feltételek április második tíz napjának közepén és a harmadik tíz nap legtöbb napján állnak elő.

Forrás: OMSZ