

Április harmadik tizedében kedvezőek lesznek a feltételek számos gombabetegség fertőzési hátterének növekedéséhez.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 22.04.2023 Брой: 4/2023



Az elkövetkezendő hétnapos időszakban az agrometeorológiai feltételeket változékony, gyakori csapadékkal járó időjárás fogja meghatározni, amely a talaj 50 cm-es rétegében a nedvességtartalékok nagyon jó szintjét fogja tartani, és kedvező feltételeket biztosít az őszi vetésű és az újonnan vetett tavaszi növények vegetációjához. Az április első és második tíz napjában lehullott jelentős csapadék az ország legtöbb részén meghaladta a havi normát (Vidin - 61 l/m?, Vraca - 84 l/m?, Veliko Tarnovo - 74 l/m?, Razgrad - 103 l/m?, Szilisztra - 77 l/m?, Sumen - 86 l/m?, Dobrich - 80 l/m?, Haskovo - 77 l/m?, Kardzsali - 60 l/m?, Elhovo - 91 l/m?, Sztara Zagora - 77 l/m?, Karnobat - 68 l/m?), és javította a nedvességtartalékokat a mélyebb talajrétegekben is.

A második tíz nap végére a legtöbb szántóföldi területen a téli gabonanövények 50 cm-es talajrétegében a nedvességtartalék elérte a teljes víztartó képesség 80-85%-át.

Az elkövetkező időszak legtöbb napján a mezőgazdasági növények fejlődése mérsékelt ütemben fog folyni, a klímánormákhoz közeli, az időszak végén kissé az alatti hőmérsékletek mellett. Az időszak alatt a búza túlnyomórészt a szárhajtás stádiumában lesz, az árpa esetében pedig a Duna-menti síkság egyes helyein (Novacene agrometeorológiai állomás) a kalászerés kezdetét is megfigyelhetjük. A téli repce túlnyomórészt a virágzás stádiumában lesz. A napraforgó és a kukorica állományokban a vetés időpontjától függően a kelés és a levélképződés figyelhető meg.

Észak-Közép- és Északnyugat-Bulgáriában ismét a tartós esőzések és a kedvezőtlen éghajlati viszonyok miatt késik a vetés. A termelők biztosították a szükséges magvakat, a területek előkészítésre kerültek, és kedvező feltételek esetén a gazdák készen állnak a vetésre az első lehetőségre. Az eddig bevetett területek nagyon kicsik az előző évek azonos időszakához képest.

Az április harmadik tíz napjára előrejelzett gyakori csapadék feltételeket teremt számos gombabetegség fertőzési nyomásának növekedéséhez: levélfoltosság és rozsdá a téli gabonafélékben; a gyümölcsfáknál – a virág- és hajtáshervasztás (korai barna rothadás), a levéllyukacsosodás, az őszibarack levélhajlító, a varasodás, ami megköveteli, hogy a csapadék megszűnését követő első lehetőségnél időben alkalmazzuk a növényvédelmi intézkedéseket.

Forrás: NIMH