

A sárga rozsdá ismét megjelent Bulgáriában

Автор(и): Corteva Agriscience™

Дата: 26.04.2023 Брой: 4/2023



Nyolc év telt el az problémás 2015 óta, amikor a bolgár gazdáknak meg kellett küzdeniük a sárga rozsdá tömeges megjelenésével a búzában.

Ma Bulgária több régiójában már riasztanak a betegség megjelenése és gyors terjedése miatt, amit a gombabetegség fejlődésének kedvező körülményei idéztek elő.

A sárga rozsdá az északabbi és hűvösebb régiókban elterjedt, nálunk pedig hosszú, nedves és hűvös tavasz idején jelenik meg, mint például 2023-ban. Gyors terjedésének fontos előfeltételei az állandó és erős szelek, amelyek a kórokozót nagy távolságokra szállítják.



fotók: Corteva Agriscience™

Főleg búzát, árpát és rozsot, valamint számos gabonaféle gyomnövényt támad meg.

Kedvező körülmények között (hőmérséklet és légköri páratartalom) rendkívül gyorsan terjed, és jelentős kárt okoz a termésben, elérve a növények terméspotenciáljának 50%-át, sőt többet is.

Tünetei a leveleken, ritkábban a szárakon, a toklászokon és az éretlen szemeken figyelhetők meg.



fotók: Corteva Agriscience™

A levéllemezeken citromsárga, keskeny, hosszanti irányban elhelyezkedő csíkok jelennek meg, amelyeken apró, kidudorodó, vonalban elrendeződő sárga uredíniumok keletkeznek egyenes, párhuzamos sorokban, mint egy varrat az erezetek között. Ezek egy ideig az epidermisz alatt maradnak, és nehezen különíthetők el a fertőzés első tüneteinél.

A fertőzött növények visszamaradnak a növekedésben, alacsonyok maradnak, leveleik csavarodnak és perzselődnek, ennek eredményeként pedig apró, ráncos szemek képződnek.

A kórokozó tömeges megjelenésének és terjedésének megelőzése érdekében ajánlott, hogy a gazdák rendszeresen ellenőrizzék gabonaföldjeiket.

A sárga rozsdá elleni védekezésre bejegyzett gombaölő szereket javasolt alkalmazni megelőző jelleggel vagy a fertőzés első látható tüneteinél.

A sárga rozsdá tömeges megjelenésének reális kockázata miatt a CORTEVA olyan gombaölő szerek használatát javasolja, amelyek hatékonyságát a kórokozó ellen bizonyították, és valós, "dolgozó" adagok mellett biztosítják a maximális védelmet.

A CORTEVA AGRSCIENCE BULGARIA AJÁNlja:

Megelőző kezelésekre – a UNIVOC®, INOVOR® és VERBEN® gombaölő szerek, amelyek kiváló eredményt nyújtanak a gyakorlatban.

Már kialakult fertőzés és első tünetek megjelenése esetén – azonnali reakció a UNIVOC® és VERBEN® gombaölő szerekkel, amelyek erős gyógyító hatással rendelkeznek.

TÖBBET A TERMÉKEKRŐL:

Az UNIVOC® kivételes védő, megállító és gyógyító hatást kínál a gabonafélékben gazdaságilag jelentős összes betegség ellen.

Univoc® – világtalan védelem a gabonafélék betegségei ellen

Az UNIVOC® kétkomponensű gombaölő szer, amely tartalmazza a prothioconazole-t, amely a legújabb triazolok egyike, szisztémás, irtó- és védőhatással, valamint a teljesen új Inatreq™ hatóanyagot egy új vegyi csoportból és új hatásmódú szerként a betegségek széles skálája ellen.

Az UNIVOC® alkalmazása rugalmas adagban történik a kezelés időpontjától függően, a következőképpen: T1 – 120 ml/da; T2 – 120 - 130 ml/da.

Az UNIVOC® bizonyított, kiemelkedő hatással és védelmet nyújt a sárga rozsdá ellen, amit független európai források is megerősítettek (AHDB, Harper Adams University, ADAS, NIAB, SRUC kutatások), a piacon lévő prothioconazole, Revysol és tebuconazole alapú kombinált termékekhez képest.

iQ-4™ formuláció a növény részeinek közel 100%-os lefedéséért és a teljes felszívódásért.

A VERBEN® kifejezetten úgy lett tökéletesítve, hogy nagy hatékonyságú betegségellenes védekezést nyújtson, ami jobb és tartós védelmet eredményez. A tökéletesített formuláció kiváló újraelosztást biztosít a terméknek a levélfelületen.

Figyelem! Figyelem! Verben® – új, széles spektrumú gombaölő szer a tökéletes betegségellenes védekezésért a gabonafélékben

A VERBEN® gombaölő szer két, a gyakorlatban bevált hatóanyagot tartalmaz a gabonafélékben gazdaságilag jelentős betegségek, mint a lisztharmat, a levél- és füzérszeptóriózis, a barna rozsda, a sárga rozsda, a helminthosporiosis, a füzérfusárium, a szárbázisrothadás, levélfoltosságok, hálózatos levélfoltosság és a ramuláriózis elleni védekezésre. A két hatóanyag kiváló szinergizmusa megbízható betegségellenes védekezést biztosít, és hozzájárul a terméspotenciál eléréséhez.

A VERBEN® adagja rendkívül rugalmas a kezelés időpontjától függően, a következőképpen: T1 – 60-70 ml/da; T2 - 80 ml/da; T3, permetlé mennyiséggel: 15-40 l/da.

INOVOR® – gombaölő szer a BASF AgCelence® koncepciójából. A pyraclostrobin és a fluxapyroxad kombinációja hosszantartó védőhatással rendelkezik, megvéd a kórokozók behatolása ellen, valamint megállító hatással, amely elpusztítja a már kifejlődött spórákat.

Egy lépéssel feljebb a védelemben

Az INOVOR® hibátlanul teljesít a szeptóriafajok, a rozsdafajok, a hálózatos levélfoltosság, a levélperzselődés, a drechslera és a lisztharmat ellen, az ajánlott adagok a következők: T1 – 75 ml/da és T2 – 90 ml/da.