

Május elején – fagyveszély a magasabban fekvő mezőkön és medencékben.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.05.2023 Брой: 5/2023



Az április második felében lehullott elterjedt csapadék a mezőgazdasági növények számára kedvező, a tértartóképesség (TK) 80–90%-a közötti talajnedvesség-tartalékokat biztosított az 50 cm-es talajrétegben.

A következő hétnapos időszakban az agrometeorológiai viszonyokat továbbra is az instabil időjárás fogja meghatározni. A mezőgazdasági növények vegetációs folyamatai mérsékelt ütemben folytatódnak az április végi és május eleji klimatikus normákhoz közeli vagy azok alatti napi középhőmérsékletek mellett. A búza főleg a szárhajtás növekedési stádiumában lesz. A repce virágzása folytatódik. A kukoricában és a napraforgóban a kelés és a levélképzés kezdete figyelhető meg. A gyümölcsfajoknál virágzás, levelesedés és a termésalapok képződése zajlik. A szőlőben 1–3 levél fejlődése figyelhető meg.

Az időszak instabil időjárása, a gyakori záporok hátráltatják a késői tavaszi növények vetés előtti talajművelését és vetését, valamint a növényvédő permetezések elvégzését. A csapadék beszüntetése után javasolt a megelőző kezelések végrehajtása a szőlő peronoszpóra és excoriose, a almafélék varasodás, a csonthéjasok virághúsosodás (korai barna rothadás) és lyukasfoltosság, valamint az őszibarack levélgöbösség ellen.

Az időszak elején a magasabban fekvő területeken és medencékben adottak lesznek a feltételek a talajfagy kialakulásához és a mezőgazdasági növények károsodásához.

Forrás: OMSZ