

Gyakori csapadék és instabil időjárás május második felében

Автор(и): Растителна защита
Дата: 20.05.2023 Брой: 5/2023



A közelgő időszakban az agrometeorológiai viszonyokat ismét instabil időjárás, gyakori csapadék fogja meghatározni, ami megőrzi a jó nedvességtartalékot a 50 és 100 cm-es talajrétegben.

Az ország legtöbb részén, néhány keleti régióbeli helyszínt kivéve (Chirpan, D. Chiflik, Karnobat), az őszi vetésű növények egy méteres talajrétegében a nedvességtartalék meghaladja a mezői vízkapacitás (FC) 80%-át.

Az időszak alatt a mezőgazdasági növények fejlődése mérsékelt ütemben fog folyni, a napi középhőmérsékletek a májusi második felére jellemző klímanormák közelében maradnak. A harmadik évtized közepére a szántóföldi területeken a téli gabonanövények a szemképződés és a szemtöltődés fázisában

lesznek. Az időszak végén az árpa esetében a déli régiók egyes helyszínein (Sandanski, Karnobat) a tejérettség stádiumának kezdetét is megfigyelhetjük.

A napraforgó és a kukorica esetében a levélképzés folyamatban lesz.

A szőlőben a virágzatkihajtás stádiuma lesz túlnyomó. Ez a fenofázis kritikus a szőlő lisztharmat (*Plasmopara viticola*) és a lisztharmatgomba (*Uncinula necator*) általi fertőzésére nézve.

Az időszak alatt előrejelzett csapadék kedvező feltételeket tart fenn a gombabetegségek fejlődéséhez: a búzánál a rozsdá, a szeptóriás levélfoltosság és a fusáriumszáraz betegség; a zöldségnövényeknél és a szőlőnél a lisztharmat; a korai cseresznyefajták termésében a késői barna rothadás.

Május végén a középkorai cseresznyefajtákat a cseresznyelégység károsítja. Ennek a veszélyes kártevőnek a kártételének csökkentésére ajánlott, hogy az érés stádiumának kezdetén, az első alkalommal a csapadék megszűnte után, rövid előzetes betakarítási idővel rendelkező rovarirtó szerekkel végezzenek kezelést.

Forrás: OMSZ