

Nagyobb valószínűsége a jégesőknek és magas a gombás kórokozók fertőző nyomása a mezőgazdasági növényekben júniusban

Автор(и): Растителна защита

Дата: 06.06.2023 Брой: 6/2023



Június első tíz napjában az agrometeorológiai viszonyokat az évszakhoz képest instabil és hűvös időjárás fogja meghatározni. Az előrejelzett csapadék a tíz nap alatt magas szinten fogja tartani a talaj nedvességtartalmát az 50 cm-es és 100 cm-es talajrétegekben – a legtöbb szántóföldi területen a teljes víztartó képesség (TVK) 80–85%-a felett. A június elején jelen lévő nagyon jó talajnedvesség-tartalékok kedvező hatással lesznek az őszi gabonanövényekre, amelyekben a déli és délkeleti régiókban a szemtöltődés, a szemképződés és a tejérettségi fázis fog zajlani. A szemtöltődés – tejérettség interfázis ideje alatt a búzát a napbogár lárvái károsítják, ami

szükségessé teszi a növények szántóföldi ellenőrzését, és amikor a kártevő sűrűsége meghaladja a gazdasági kárküszöböt (2 lárva/m²), időbeni kezelést.

A második tíz nap elején tapasztalható hűvös idő után hőmérséklet-emelkedés és a mezőgazdasági növények fejlődési ütemének felgyorsulása várható. Június közepéig a legtöbb szántóföldi területen az árpa eléri a viaszérettségi fázist.

Június második felének legtöbb napján a mezőgazdasági növények fejlődése az éghajlati normákhoz közeli hőmérsékletek mellett fog zajlani. A harmadik tíz nap elején a búza túlnyomórészt az érési fázisban lesz.

A hónap végére a tavaszi növények egy része reprodukzív fejlődési fázisokba lép: a napraforgónál a virágzás kezdetét figyelhetjük meg, a korai hibrid kukoricáknál pedig a virágzat kifejlődését és a virágzat virágzását.

A júniusi meteorológiai viszonyok fokozott gombás kórokozók fertőzési hátterét fogják fenntartani: lisztharmat a zöldségnövényekben, késői barna rothadás a kései cseresznyefajtáknál, varasodás és lisztharmat a gyümölcsfákon. A szőlőben az infloreszcencia virágzásától a borsószem méretű bogyóképződésig tartó interfázis kritikus a lisztharmat fertőzés szempontjából.

A hónap folyamán a növényvédő permetezések végrehajtására kedvezőbb feltételek a második tíz nap első felében és a harmadik tíz nap legtöbb napján állnak elő.

Júniusban a jégeső valószínűsége továbbra is magas marad. Jégeső után az érintett gyümölcs- és zöldségnövényeket az első lehetőség szerint (lehetőleg az eseményt követő 48 órán belül) réztartalmú gombaölő szerekkel kell kezelni.

Forrás: OMSZ