

Július – próbatétel a mezőgazdasági növények számára

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.07.2023 Брой: 7/2023



Július első és második szakaszának legtöbb napján az agrometeorológiai feltételeket továbbra is instabil időjárás, gyakori csapadék határozza meg, ami akadályozni fogja a szezon legfontosabb tevékenységét – a búza betakarítását és a mezőgazdasági növények betegségek és kártevők elleni időben történő kezelését. A júniusi átlagnál magasabb csapadékmennyiség az ország legtöbb részén, a délkeleti régiók kivételével, rontotta a zöldségfélék és gyümölcsfák fitoszociális állapotát, és a nyugati régiók egyes helyein a cseresznye termésének csökkenéséhez vezetett.

Július első és második szakaszában ismét intenzív, jelentős csapadék és jégeső nagyobb valószínűséggel jósolják – ez újabb kihívást jelent a mezőgazdasági növények számára, és kockázatot jelent az érett gabona

betakarításának szétszóródására. Ebben az időszakban a tavaszi növények növekedése kielégítő nedvességellátás mellett mérsékelt ütemben fog folyni, a napi középhőmérsékletek a klimatikus normákhoz közeli értékek mellett. A kukoricában, a korai érés függvényében különböző fejlődési szakaszok figyelhetők meg: levélképződés, virágzatképződés, a virágzat virágzása és a selyemszálak megjelenése. A napraforgóban a vetésterületeken virágzás, megtermékenyítés és a szemek töltődése zajlik majd.

A harmadik szakaszban a mezőgazdasági növények fejlődése a július végére jellemző meleg körülmények között fog folyni. Ebben az időszakban rendkívül magas maximum hőmérsékleteket jósolnak, helyenként akár 38-39°C-ot is, ami kedvezőtlenül hat a zöldségfélék és a késői kukorica hibridjeinek virágzására és megtermékenyítésére. A szakasz során a korai kukorica hibridjek a tejérettség szakaszába lépnek. Az agrotechnikai időkereten belül vetett napraforgónál, a Duna-menti síkság egyes területein, az érés szakaszának kezdetét figyelhetjük meg.

A július harmadik szakaszára jósolt viszonylag száraz és forró időjárás korlátozni fogja számos gombabetegség terjedését, kivéve a lisztharmatot a gyümölcsfákon, zöldségféléken és a szőlőben. A gyümölcsstermő növényeknél nem szabad alábecsülni a gyümölcsmoly második generációjának ellenőrzését. A betegségek és kártevők elleni kezeléseket a nap hűvösebb óráiban kell végezni, a növényvédő szerek betakarítás előtti várakozási idejét figyelembe véve, a termények érési idejéhez igazodva.

Forrás: OMSZ