

Az ültetvényen júliusban

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.07.2023 Брой: 7/2023



Júliusban azon **almaültetvényeken**, ahol nem jelent meg varasodás, a permetezést e betegség ellen beszüntetik. Fertőzés jelenlétében a leveleken és terméseken, valamint gyakori záporok esetén a késői fertőzések és a terméskárosodás mértékének növekedésének kockázata fennáll, ami ebben az esetben kezeléseket tesz szükségessé még ebben az időszakban is.

A lisztharmatra érzékeny almafajtáknál a permetezés e betegség ellen is folytatódik. A két betegség egyidejű ellenőrzésére a következő gombaölő szerek egyikét alkalmazzák: Bellis – 80 g/da, Sulgran – 750 g/da és Kumulus – 600–900 g/da a lisztharmat ellen, valamint Chorus 50 WG – 0,03%, Difcor 250 EC – 15 ml/da, Koprations Duo – 300 g/da, Scab – 300 ml/da és Captan 80 WG – 150–180 g/da a varasodás ellen. A két

betegség egyidejű kezelésére a következők alkalmasak: Flint Max 75 WG – 0,02%, Score 250 EC – 0,02%, Luna Experience – 20–75 ml/da, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da, Revyona – 200 ml/da.

A varasodást okozó gomba (*Venturia inaequalis*) rezisztenciájának megelőzése érdekében a legjobb, ha a kórokozóra különböző hatásmódú termékeket váltogatunk, vagy gombaölő keverékeket alkalmazunk annak ellenőrzésére.

A varasodásra rezisztens fajtákat – Prima, COOP-10, Frolina, Liberty, Jonafree, Jonathan, Pioneer, McFree, Pilot, Topaz, Novamak, Sava, Rubinola stb. – csak a lisztharmat ellen permetezik.

A **körte** esetében folytatni kell a permetezést a varasodás, valamint a fehér és barna levélfoltosság ellen. E betegségek ellenőrzésére a következő gombaölő szerek egyikét alkalmazzák: Difcor 250 EC – 15 ml/da, Luna Experience – 20–75 ml/da, Captan 80 WG – 150–180 g/da, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da.

A **szilva** esetében júliusban a permetezés a barna rothadás és a rozsda ellen irányul. A barna rothadás ellen a következő gombaölő szerek egyikével végeznek permetezést: Difcor 250 EC – 20 ml/da, Captan 80 WG – 150–180 g/da, Chorus 50 WG – 0,045%, Geoxe – 40–60 g/da. A rozsda ellen a Signum WG – 45 g/da használható, amely hatásos a barna rothadás ellen is.

Július elején a korai **őszibarack**-fajták termései érik be, és ebben az időszakban nem permetezik őket. A **késői őszibarack-fajtáknál** folytatódik a lisztharmat, a lyukas foltosság és a barna rothadás elleni védekezés. A lisztharmat ellen a következő gombaölő szerek egyikét alkalmazzák: Score 250 EC – 0,02%, Luna Experience – 50 ml/da, Topaz 100 EC – 0,03%, Thiovit Jet 80 WG – 600 g/da. A barna rothadás elleni védekezéshez a permetezést Delan 700 WDG – 0,05%, Chorus 50 WG – 0,045% vagy Luna Experience – 63–75 ml/da anyagokkal végzik.



Júliusban a sárgabarack érik, és azt nem permetezik.

A **málna** esetében ebben az időszakban nem végeznek permetezést, kivéve a **remontáló fajtákat**, mint például a Lyulin. Ezeknél a didymella és az antraknózis elleni kezelések szükségesek. A következő gombaölő szerek egyikét alkalmazzák: Signum WG – 100 g/da és Funguran OH 50 WP – 0,15%. Gyakori záporok és magas levegő páratartalom esetén a szürke penész elleni permetezés is szükséges. Ekkor a Switch 62.5 – 100 g/da anyagot használják.

A betakarítás után az **eperültetvények** leveleit lenyírják, eltávolítják a ültetvényről, és elégetéssel vagy eltemetéssel semmisítik meg, hogy lebomoljanak.