

A július második fele – száraz és forró időjárás

Автор(и): Растителна защита
Дата: 15.07.2023 Брой: 7/2023



Július második felében a mezőgazdasági növények fejlődése felgyorsult ütemben fog folytatódni a júliusi második tíz napra előírt átlag feletti hőmérsékletek hatására.

A kukoricánál a hibridek korai érési idejétől függően különböző fejlődési fázisok figyelhetők meg – levélképzés, virágzatképzés, a füzér virágzása és a selymeszálak megjelenése. A napraforgónál virágzás és a magok töltődése zajlik. A növények aktív vízfogyasztása és az időszak alatt bekövetkező mezőgazdasági szempontból jelentős csapadék hiánya a talajvízkészletek csökkenéséhez vezet. Kelet-Bulgária egyes területein a talaj 50 cm-es rétegében a talajnedvesség kimerülése várható, ami megfelelő öntözési rend alkalmazását teszi szükségessé.

A növényvédő permetezések végrehajtására a nap hűvösebb óráiban, este és kora reggel lesznek kedvező feltételek. Az időszakban folytatni kell a kezeléseket a lisztharmat, a varasodás és a almamoly ellen a gyümölcsösökben, valamint a lisztharmat és a szőlőmoly ellen a szőlőültetvényekben.

Az előrejelzett forró és száraz időjárás miatt a gabonaszüretet fokozott óvatossággal és az agrotechnikai intézkedések betartásával kell végezni, hogy megelőzzük a tüzek kialakulásának veszélyét a mezőgazdasági területeken.

Forrás: NIMH