

Július végén és augusztus elején – a mezőgazdasági növények fejlődése a klímai normákhoz közeli hőmérsékleten és a talajnedvesség hiányában zajlik majd.

*Автор(и): Растителна защита
Дата: 28.07.2023 Брой: 7/2023*



A július harmadik tíz napjának legtöbb napján uralkodó forró időjárás, a 40-42°C-ot is elérő és meghaladó rendkívül magas napi maximumhőmérsékletek megzavarták a mezőgazdasági növények vegetációs folyamatainak normális lefolyását. Ezek az értékek a késői tavaszi növények egy részében hőstresszt és levélperzselődést, a gyümölcsfáknál pedig korai levélhullást okoztak. (A szilisztrai agrometeorológiai állomáson a nem öntözött körülmények között termesztett kukoricaállományok 50%-ánál megfigyeltek korai levélsárgulást).

Az elmúlt hétvégi rövid, de jelentős lehűlés után, július utolsó napjain és augusztus elején a mezőgazdasági növények fejlődése a klimatikus normákhoz közeli hőmérsékletek mellett, talajnedvesség-hiányos körülmények között fog folytatódni. A július végi csapadék lokális jellegű volt, és az ország legnagyobb részén, kivéve az északnyugati (N. Selo, Lom, Knezha, Pleven) és délkeleti régiók (Szilven, Karnobat, Burgasz) egyes helyeit, elenyésző, 10 l/m² alatti volt. Az előrejelzések szerint a következő időszakban nem várható agronómiai jelentőségű csapadék, így a megfelelő öntözési rend alkalmazása továbbra is elsődleges intézkedés a késői mezőgazdasági növények esetében. Augusztus elején a korai kukoricahibridek a térszaállományú érés, a középkorai hibridek a tejállományú érés stádiumába lépnek, a későbbi kukoricahibrideknél pedig a szemek képződése és tömörülése zajlik. A napraforgónál a Duna-menti síkság és a déli régiók egyes részein az érési stádium fog zajlani.

Július végén és augusztus elején a növényvédő permetezéseket a hűvösebb órákban kell elvégezni, a betakarítás előtti várakozási idővel rendelkező, a növények érési idejéhez igazodó termékek alkalmazásával. A gyümölcsösökben nem szabad alábecsülni a gyümölcsmoly második generációjának ellenőrzését. Az elmúlt időszak végén bekövetkezett jégeső által károsított zöldségnövények réztartalmú gombaölő szerekkel való kezelését javasoljuk.

Forrás: NIMH