

Szeptember – kedvező feltételek a késői zöldségfélék további terméshozamának kialakulásához

Автор(и): Растителна защита

Дата: 04.09.2023 Брой: 9/2023



Szeptember első tíz napjának legtöbb napján a normál feletti hőmérsékleti viszonyokat jósolják, ami felgyorsítja a késői mezőgazdasági növények fejlődésének utolsó szakaszait. Ebben az időszakban a középkéső kukoricahibridek a viasz- és teljes érettségi stádiumban lesznek, míg a késői hibridek a tejérettségi stádiumban és az átmenetben a viaszérettség felé.

A második tíz nap elején változás következik be az agrometeorológiai viszonyokban. A harmadik tíz nap közepéig instabil időjárás és a klimatikus normákhoz közeli hőmérsékletek határozzák meg őket. Ebben az

időszakban gazdasági jelentőségű csapadék várható, amely a kialakult aszály után javítja az őszi vetésre szánt területek elővető művelésének feltételeit. Szeptember második tíz napjának végéig tart az optimális agrotechnikai időszak a tépirapa vetésére.

A második tíz nap alatt a késői kukoricahibridek is befejezik fejlődésüket, a rizs pedig a viasz- és teljes érettségi stádiumban lesz. A második és a harmadik tíz nap első felében jósolt gyakori csapadék növeli a betegségkeltő kórokozók terjedésének kockázatát, amelyek az érésben lévő gyümölcs- és zöldségtermést okozzák – szürkepenész a szőlőben (*Botrytis cinerea*), késői barna rothadás (*Monilinia fructigena*) az őszi-téli gyümölcsfajták termésén, krumplivész (*Phytophthora infestans*) a késői termésű paradicsomon, stb.

A harmadik tíz nap második felében száraz idő és kedvező feltételek várhatók a szőlőtermés betakarításához. A nyári, normál feletti hőmérsékletek következtében a későbbi borszőlő-fajták egy része a szokásos időpontnál korábban éri el a technológiai érettséget.

Szeptember végén célszerű a körteültetvényeket ellenőrizni egy veszélyes kártevő, a körte rügylakó (*Anthonomus piri*) jelenléte szempontjából. A kártevő elleni védekezés csak az imágók ellen hatékony az ősz elején. Ha a kártevő egyedszáma meghaladja a gazdasági károküszöböt (3 bogár faonként), kezelés szükséges.

Szeptemberben nem várhatók kritikus minimumhőmérsékletek, és a viszonyok lehetővé teszik a fagyérzékeny, késői zöldségnövények további termésképződését.

Forrás: OMSZ