

Kártevők a gyümölcsösben szeptemberben

Автор(и): Растителна защита
Дата: 02.09.2023 Брой: 9/2023



Szeptemberben csökkennek az átlagos napi hőmérsékletek, a hónap második felében pedig korai fagyok, zivatarok és jégesők fordulhatnak elő, amelyek komoly károkat okoznak a növényekben és a termésképzésben. Az időszakot a nyári állapotok fokozatos átmenete jellemzi az őszi-téli feltételek felé. A fák levélapparátusa nagyon aktívan fotoszintetizál, asszimilátumokat biztosítva a termés táplálásához, a termésrügyek differenciálódásához és a tartalék tápanyagok felhalmozásához. A jobb tápanyagfelhalmozás, a téli alacsony hőmérsékletek könnyebb elviselése és a következő év normális termésképzése érdekében szükséges a gyümölcsök időben történő leszedése.

A gyümölcsfélék betegségeinek terjedése ebben az időszakban csökken, de esős körülmények között fertőzések léphetnek fel a varasodásból, még az őszi és téli fajták betakarítása során is. A kártevők

egyedszáma jelentősen csökken, mivel sokuk inaktív fejlődési stádiumba – bábra és petébe – lépett, ám a valamely utolsó nemzedékeiből kikelt hernyók továbbra is okozzák a férgesedést.



Gyümölcsfa vörösatka

Szeptemberben a faj károsító tevékenysége folytatódik. A lárvák, nümfák és imágók nedveket szívják a levelekből, aminek következtében a klorofilltartalom csökken, és ez kedvezőtlenül hat a fotoszintézisre. Erős fertőzés esetén a levelek idő előtt kiszáradnak és lehullanak.

Védekezés: A telelő atkapeték állományának csökkentésére permetezést kell végezni, ha a gazdasági kárküszöb (3–4 mozgóképes forma/levél) elérhető.

Engedélyezett növényvédő szerek: hatóanyag hexythiazox 31,2 g/l + fenpyroximate 62,4 g/l – Nissorun Plus 120 ml/da; hatóanyag acequinocyl 164 g/l – Kanemite SC 120–180 ml/da; hatóanyag Beauveria bassiana, ATCC 74040 törzs 0,185 g/l – Naturalis – 100–150 ml/da; hatóanyag paraffin olaj 800 g/l – Ovipron Top EC – 1000–2000 ml/da; hatóanyag tebufenpyrad 200 g/kg – Shirudo – 25 g/da.



Körtelombot

Szeptemberben befejeződik a negyedik nemzedék fejlődése és megkezdődik az ötödik nemzedék fejlődése. Az imágók és lárvák nedveket szívnak és bőséges mézharmatot választanak ki, ami korompenész képződéshez vezet. Erős fertőzés esetén egész fák pusztulhatnak el.

Védekezés: A tömeges telelőhelyre vonulás előtt, a telelő körtelomb-állomány csökkentésére permetezést kell végezni, ha a gazdasági kárküszöb (faonként 4–6% olyan hajtás, amelyen imágók és lárvák kolóniái találhatók) elérhető.

Engedélyezett növényvédő szerek: hatóanyag tebufenpyrad – Shirudo 25 g/da; hatóanyag spirotetramat – Movento 100 SC 0,12–0,15%; hatóanyag Beauveria bassiana, ATCC 74040 törzs 0,185 g/l – Naturalis – 100–150 ml/da; hatóanyag deltamethrin 100 g/l – Decis 100 EC – 100–150 ml/da.



Körte rügypusztító

A körte komoly kártevője, évente egy nemzedéke fejlődik, és peteként telel a rüggekben. A lárvák tavasszal kelnek ki, a bogarak májusban jelennek meg és szeptember végéig diapauzisba (nyugalmi állapotba) vonulnak. Későbbi újbóli megjelenésükkor petéiket a rüggekbe rakják, ahol azok telelnek.

Védekezés: A védekező intézkedések a peték lerakása előtt, az első párosodó példányok őszi felderítésekor, az imágók ellen irányulnak.

Engedélyezett növényvédő szerek: Hivatalosan regisztrált termék nincs; minden kontakt rovarölő szer alkalmazható más kártevők ellen használt koncentrációban.

** A cikk 2025.09.15-én frissült.*