

Október – optimális feltételek a téli gabonanövények vetéséhez, valamint a zöldségfélék és a kései fajtájú gyümölcsfák és szőlők további terméséhez.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 01.10.2023 Брой: 10/2023



Októberben az agrometeorológiai feltételeket a normál körüli és az azt meghaladó hőmérsékletek, valamint a havi normál körüli és az azt alulmúló csapadékmennyiségek fogják meghatározni.

Október elején a előrejelzett a normál feletti hőmérsékletek, elérve a maximum 30-32°C-ot is, felgyorsítják a késői gyümölcsfajták és szőlők érési folyamatait, és lehetővé teszik a késői szántóföldi termesztésű zöldségfélék (paradicsom, paprika, cukkini, kígyóuborka) további termésének betakarítását. A megszokottnál

melegebb feltételek következtében a késői vörösborszőlő-fajták a szokásos időpontnál korábban érik el a technológiai érettséget, az őszi gyümölcsfajták pedig a szedési érettséget.

Az első évtized második felében tapasztalható viszonylag száraz és az évszakhoz képest meleg időjárás után változás áll be az agrometeorológiai viszonyokban. Ebben az időszakban jelentős minimumhőmérséklet-csökkenés várható, a medencékben és a magasabban fekvő területeken fagy kialakulásának lehetőségével, ami megkívánja a fagyérzékeny zöldségfélék (paradicsom, paprika) időben történő betakarítását.

Az első évtized végén és a második évtized elején gazdaságilag jelentős csapadék várható, ami javítja a talaj felső rétegeinek nedvességtartalmát és a szezonális talajművelési munkák végrehajtásának feltételeit. A nyár végi és őszi szárazság az ország több részén, a délkeleti régiók kivételével, késleltette az őszi vetésre szánt területek vetés előtti művelését. Emiatt a vetésterületek nagy részén szeptemberben a téli repce vetésére előírt agrotechnikai határidő nem tartható be.



Október a téli gabonanövények vetésének optimális időszaka. Az első évtized a búza vetésének agrotechnikai határideje Észak-Bulgáriában, október 15. és 25. között Dél-Bulgáriában, a hónap végén pedig a Fekete-tenger partvidékén.

Október második felének legtöbb napján a vetett őszi növények vegetációjának kezdeti szakaszai a normál feletti hőmérsékleti viszonyok között fognak lezajlani. A harmadik évtized közepén és végén csapadék

valószínűsége, a talaj 50 cm-es rétegében lévő nedvességtartalék javulása, valamint a téli gabonanövények fejlődési feltételeinek javulása várható. Október végén a búzában a vetési időponttól függően a következő fejlődési szakaszok figyelhetők meg: kelés és levélképződés (1-3 levél).

A normál körüli és feletti októberi előrejelzett hőmérsékleti viszonyok előfeltételei a mezei pocok – az őszi vetések egyik veszélyes kártevőjének – egyedszámának növekedésének. A hónap végén felmérést kell végezni az őszi vetéseken a kártevő jelenlétére, és ahol a sűrűsége meghaladja a gazdasági károkszöböt (2 aktív kolónia/decárem), időben el kell végezni a növényvédelmi intézkedéseket (mérgezett csalétket kell elhelyezni a kolóniák bejáratainál).

Az alma- és körteültetvényekben, a lombhullás kezdetén, a gyümölcsök betakarítása után ajánlott a fák permetezése 5%-os karbamid-oldattal. Ez a kezelés korlátozza a varasodás fertőzést.

A csonthéjas gyümölcsfajoknál a baktériumos rák, a barack levélfodrosodás, a lyukasfoltosság, valamint a sárgabarack, a cseresznye és a meggy korai barna rothadása ellen a tömeges lombhullás után permetezést kell végezni 2%-os bordói lével.

Forrás: NIMH