

Október második felében a talaj felső rétegének hidrofizikai állapotában várható javulás.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 16.10.2023 Брой: 10/2023



Az október első és a második évtized eleji csapadékhiány a folyamatban lévő aszály elmélyüléséhez vezetett. Az ország szántóföldi régióinak nagy részében a 50 cm-es talajrétegben nincs termelő nedvesség, és Délnyugat-Bulgária egyes területein (a kjusztendili agrometeorológiai állomás) – az egész egy méteres rétegben.

Az október közepéig előrejelzett száraz és évszaknak megfelelően meleg időjárás után, a második évtized második felében változás áll be az agrometeorológiai viszonyokban. Ebben az időszakban elterjedt csapadék várható, egyes helyeken akár $15-20 \text{ l/m}^2$ is, ami javítja a felső talajréteg víz-fizikai állapotát és a téli gabonák vetésére szánt területek elmaradt vetés előtti talajművelésének végrehajtási feltételeit. Az aszály miatt a

szántóföldi régiók sok helyén szeptemberben elmulasztották a téli repce vetésének agrotechnikai határidejét. Késések várhatók a téli gabonafélék vetésében is. Október közepén lejárnak az optimális határidők a búza vetésére Észak-Bulgáriában. A következő időszakban kezdődnek a téli gabonafélék vetésének agrotechnikai határidejei az ország déli régióiban.



A dobruzsai aszály megnehezíti a területek előkészítését a búza őszi vetéséhez. Az új termés magjainak elhelyezésének optimális határideje október végéig tart, ahogyan a Dobrudzsai Agrárkutató Intézet – General Toshevo tudósai közlik.

A vetési időszak nagymértékben függ az éghajlati viszonyoktól. Az utóbbi években nem volt ritka, hogy a vetési kampány novemberben is folytatódott. Ugyanakkor a növények állapota nagymértékben függ attól, hogy milyenek lesznek a hőmérsékletek és a csapadék novemberben és decemberben, valamint attól, hogy a növények milyen mértékben keményednek meg a teleléshez.

A következő időszak második felében előrejelzett csapadéknak várhatóan biztosítania kell a szükséges nedvességet az őszi növények vegetációjának kezdeti fázisaihoz. Október második évtizedének végén a bevetett téli gabonaféléknél (a targovistyei agrometeorológiai állomás) a csírázási fázis és a kezdeti levélképzés zajlik majd.

Kedvező feltételek alakulnak ki a szőlőszüret befejezéséhez és az őszi gyümölcsfajták begyűjtéséhez az időszak elején és végén.

Forrás: OMSZ