

Novemberban kedvezőek lesznek a feltételek az időszakos talajművelés és az elmaradt őszi vetés elvégzéséhez.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 05.11.2023 Брой: 11/2023



Novemberben az agrometeorológiai feltételeket a klímánorma körüli vagy azt meghaladó hőmérsékletek és csapadék határozzák majd meg.

Az októberi szűkös csapadék és a szokatlanul magas hőmérsékletek a már létező aszály elmélyüléséhez vezettek. A késő ősz folyamán a talaj 50 cm-es rétegében a talajnedvesség-tartalékok teljesen kimerültek, és a szántóföldi régiók egy részében a termékeny nedvesség hiányzik a teljes egy méteres talajrétegben. Az ország

számos részén a kedvezőtlen feltételek miatt elhalasztották az őszi növények vetésére szánt területek vetés előtti művelését, és elmulasztották a téli gabonanövények vetésének agrotechnikai határidejét.

A késői vetés esetén általában ajánlatos a vetésmennyiség 5-10%-os növelése annak érdekében, hogy a termékeny elszárasodás hiányában megőrizzék a négyzetméterenkénti kalászkok számát, így a hozam megmaradjon" – osztja meg tapasztalatait Alexiev főmunkatárs az IRGR "K. Malkov" intézetből, Sadovóból a Nivabg.com számára.

November első tíz napjában fokozatos, kedvező változás várható az agrometeorológiai feltételekben. A hónap elején csapadékot, valamint a felső talajréteg vízfizikai állapotának és a szezonális talajművelés, valamint az elhalasztott őszi vetés végrehajtásának feltételeinek javulását jósolják.

Gazdasági jelentőségű csapadék és a talajnedvesség-tartalékok növekedése várható a talaj 50 cm-es rétegében november második felében. Ebben az időszakban a vetett őszi növények vegetációjának kezdeti fázisai a normál feletti napi középhőmérsékletek mellett zajlanak majd. November végén különböző fejlődési fázisok figyelhetők meg a búzában és az árpában – a csírázástól az 1., 2. és 3. levélig.

A hónap folyamán nem várhatóak kritikus minimumhőmérsékletek a csírázási fázisban lévő téli gabonanövények számára.

Novemberben a gyümölcsfák ültetésére és a gyümölcstermő növények őszi növényvédő permetezésére, amely a varasodás, a korai barna rothadás, a lyukasfoltosság, az őszibarack levélhajlító varasodása és egyéb áttelelő kórokozók fertőzéseinek korlátozását célozza, alkalmasabb feltételek a második tíz napban és a hónap végén állnak majd elő.

Forrás: NIMH