

Ideje az őszi málnaültetésnek

Автор(и): Растителна защита
Дата: 09.11.2023 Брой: 11/2023



A málna számos előnnyel rendelkezik más gyümölcsfajokhoz képest – később virágzik, nem szenved a tavaszi fagyoktól és minden évben terem. Gyümölcsei ízletesek, táplálóak, jó gyógyhatással bírnak. Erősítik a szív működését, vitaminokkal és ásványi anyagokkal gazdagítják a szervezetet, és fokozzák az étvágyat. Ismert lázcsillapító hatásuk, amely a szalicilsav jelenlétének köszönhető.

A málnaültetvény helyének kiválasztása a növény éghajlati és talajviszonyokra vonatkozó igényeinek megfelelően történik. A telepítés előtti talajelőkészítés magában foglalja a 30–35 cm mély szántást, a műtrágyák bevítéséhez szükséges sekély szántást és a kultiválást. Istállótrágyát alkalmaznak.

A telepítés legmegfelelőbb időszaka október végétől a hideg időjárás beálltaig tart. A telepítés tavasszal is lehetséges – március végéig. A sorok közötti távolság 1,8–2 m között van. A telepítés kézzel, kb. 35 cm mély barázdákban történik.

Az új ültetvényeket 8–10 kg/dka nitrogénnel, a termő ültetvényeket 8–12 kg/dka nitrogénnel trágyázzák. Nehezebb talajokon a nitrogént egyszer, kora tavasszal, könnyebb talajokon kora tavasszal és május végén adják be. A termő ültetvények tápanyag-pótlása a virágzás után történik. Ha a csapadék nem elegendő, szükség szerint öntöznek augusztus közepéig. A metszést minden évben végrehajtják, amely során eltávolítják a termő, kétéves vesszőket és ritkítják az egyéves vesszőket. A telepítés második évében növényenként 2–3 vesszőt hagynak termésre, a többi alacsonyan visszavágják. A harmadik és negyedik évben a termő vesszők száma növekszik, és az ültetvények teljes termőbeállításba kerülnek. Tavasszal, a rügyek duzzadásakor végeznek metszést, eltávolítva a téli fagyok, betegségek és kártevők által károsítottakat.

A lágyszárú gyümölcs-cserjék nyári gondozása

A málna károsítója a didymella betegség, a vesszőpusztulás, a rozsdás, az antraknóz, és a vírusok közül – a mozaik és az erek klórózisa. A málna leggyakoribb kártevői a málnaormányos, a levéltetvek, az Agrilus, a málnaforrázó és a málnalégy.



Bulgáriában a következő málnafajták a legelterjedtebbek:

Lyulin – a gyümölcsök augusztus 27. és október 3. között érik be. Nagyok, élénkpirosak, fényesek, kemények, nagyon jó ízűek és mérsékelt illatúak. A növények erőteljesek és mérsékeltén növekvők. A fajta nagyon termőképességű és támaszték nélkül is termeszthető.

Willamette – egy mérsékeltén termőképességű amerikai fajta. A gyümölcsök július 6–8. között érik be. Közepes méretűek, kúp alakúak, kis magvakkal. Jó édes-savanykás ízűek és illatúak. A növények mérsékeltén növekvők és hűvösebb régiókban, öntözés mellett termesztik.

Bolgár Rubin (Bolgár Rubint) – a gyümölcsök június 28–30. között érik be. Közepes méretűek, enyhén kúposak, rubinpirosak, nem hullanak szét egyes csonthéjakra, és kellemes édes-savanykás ízűek, mérsékelt illatúak. A fajta nagyon termőképességű.

Shopska Alena – a gyümölcsök július 3–5. között érik be. Közepes vagy nagyok, tompán kúposak, élénkpirosak, mérsékelt fényűek és kis magvakkal rendelkeznek. Könnyen leszedhetők, nagyon jó édes-savanykás ízűek, mérsékelt illatúak. Feldolgozásra és fagyasztásra alkalmasak. A növények erősen növekvők, enyhén borítja őket finom tüskék. A fajta nagyon termőképességű.