

November végén az instabil és nedves időjárás korlátozni fogja a talajművelési munkálatok és a gyümölcsültetvények fitoszerviz tevékenységeinek végrehajtását.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.11.2023 Брой: 11/2023



Az elmúlt időszakban Kelet-Bulgária számos területén és Nyugat-Bulgária egyes helyein 20-50 l/m² közötti csapadékot jegyeztek fel, ami növelte a talaj nedvességtartalmát az 50 cm-es rétegben Szilisztra, Dobrics, Sumen, Razgrad, Elhovo, Várna, Burgasz, Ahtopol, Karnobat, Novo szelo, Vidín, Lom, Szófia és Dragoman térségében.

November végére elterjedt csapadék és a nedvességtartalék növekedése várható a mélyebb talajrétegekben. Az átlagos napi hőmérsékleti értékek előrejelzése szerint a téli gabonafélék és a téli repce fejlődéséhez szükséges biológiai minimum körül, vagy az alatt lesznek. Nyugat-Bulgáriában és a Duna-menti síkságon a csapadék hó formájában hullik, és hóréteg alakul ki, amely megvédi a legkésőbb vetett növényeket az előre jelzett, helyenként mínusz 7-8°C-ig érő negatív hőmérsőletektől. Csak a Fekete-tenger mentén és a legdélebbi régiókban alakulnak ki olyan feltételek, amelyek késleltetett vegetációt idézhetnek elő az őszi vetésű növényekben. Az időszak alatt a téli gabonaféléknél a következő növekedési stádiumok figyelhetők meg: kelés és levélképződés (1-2-3 levél). A Duna-menti síkság egyes helyein – a Szilisztra és Novacsene agrometeorológiai állomásokon – a korábban vetett búzanövények november közepén beléptek a harmadik levél stádiumába.

Az időszak instabil és párás időjárása korlátozni fogja a szezonális talajművelési és fitoszerviz tevékenységek végrehajtásának lehetőségeit a évelő növényekben.

Forrás: NIMH