


Kiváló megoldás a gyomirtásra búzában, árpadban, zabban és rozsban.

Автор(и): ФМС АГРО БЪЛГАРИЯ

Дата: 30.11.2023 Брой: 11/2023



A gabonatermesztők olyan gyomirtókat keresnek, amelyek egyetlen kezeléssel széles spektrumú széleslevelű gyomokat képesek elpusztítani. Ez segít optimalizálni erőforrásaikat a munkaigényes időszakokban.

Az FMC **Tripali® WG** herbicidje különféle gabonanövényekben használható a nehezen irtható galaj és egyéb gyomok elleni védekezésre.

A **galaj** az egyik legproblematicusabb gyom Európában. Verseng a gabonanövényekkel a vízárt, fényért, tápanyagokért és a növekedési térért. Még négyzetméterenként egyetlen növény is akár 5%-os

termésveszteséghez vezethet. Emellett a galaj különösen problémás lehet az aratás során. Amikor az **Tripali® WG** hatóanyagával kezelik, a galaj többé nem jelent problémát.

Az **Tripali® WG** homogén granulátum keverék, vízben diszpergálható granulátum (WG) formában. Három hatóanyagot tartalmaz: metszulfuron-metilt, tribenuron-metilt és florasulamot. Ajánlott permetlé mennyiség – 10 – 40 l/da. A gyomfertőzöttségtől és a gyomfajtól függően a használt permetlé mennyiségnek biztosítania kell a levélállomány teljes és egyenletes lefedését. Az alkalmazási arány 3,5 – 5 g/da.

Az **Tripali® WG** szisztémás szelektív herbicid, amely főleg a leveleken keresztül szívódik fel, és alkalmazását követően rövid időn belül a gyomok növekedési pontjaiba transzportálódik. Hatásmódja az acetolaktát szintáz (ALS) enzim gátlásán alapul. A növekedéshez és a sejtosztódáshoz folyamatos fehérjeszintézis szükséges. A valin, leucin és izoleucin elengedhetetlen a növényi sejtosztódáshoz és növekedéshez. Az érzékeny gyomoknál a termék alkalmazását követően órákon belül megáll a sejtosztódás, ami a növekedés azonnali leállítását okozza. Látható tüneteket (gyomok elszíneződése, kifehéredés, nekrózis) a kezelést követő 1-2 héten belül figyelhetünk meg, ami szintén függ a növekedési feltételektől és a gyomok érzékenységétől. A kevésbé érzékeny és nagyobb gyomok nem pusztulhatnak el teljesen, de fejlődésük gátolt marad, és nem versenyeznek a termesztett növényvel a vízért és tápanyagokért.

A maximális hatás eléréséhez az **Tripali® WG** alkalmazása aktívan növekvő gyomok korai növekedési stádiumában, a kultúrnövény harmadik levélképződése után ajánlott. Magas gyomsűrűség vagy vastag viaszréteggel vagy szőrökkel rendelkező gyomok jelenlété esetén a jobb hatásfok érdekében ajánlott a Trend 90 segédanyag hozzáadása a Tripalihoz.

Az **Tripali® WG** széles alkalmazási ablakkal rendelkezik, ami nagyobb rugalmasságot biztosít a gazdálkodónak. A korai kezelés segít megelőzni a galaj és más problémás gyomok versengését a kultúrnövény által igényelt vízért és tápanyagokért.

Az **Tripali® WG** egy bevált, nagyon hatékony, széles spektrumú herbicid, amelyet azért fejlesztettek ki, hogy univerzális megoldást nyújtson a széleslevelű gyomok elleni védekezéshez gabonanövényekben.