

A tél kezdete – magas hőmérséklet és kedvező körülmények a fagyálló zöldségfélék őszi vetéséhez.

Автор(и): Растителна защита

Дата: 22.12.2023 Брой: 12/2023



December végén jelentős változáson mennek át az agrometeorológiai viszonyok. A tél kezdetén a szezonálisan meleg időjárás fogja meghatározni azokat. Az előrejelzések szerint december harmadik dekádjának közepén az átlagos napi hőmérsékletek elérik és meghaladják a téli gabonanövények vegetatív folyamatainak folytatásához szükséges biológiai minimumot az ország mezőgazdasági régióiban. A Duna-menti síkság északnyugati részén és a délkeleti régiókban a decemberi, normál feletti hőmérsékletek – 15-16°C feletti maximumértékekkel – feltételeket teremtenek a búza és az árpa növekedésének folytatásához.

December végére a téli gabonanövények túlnyomórészt a 2-3 levél fejlődési stádiumában lesznek. A novemberben későn bevetett állományok egy része elégtelenül keményedett állapotban, a kelés és a kezdeti levélképződés stádiumában lép a télbe. Csak a Duna-menti síkságon (Novacene agrometeorológiai állomás) és a Felső-Tráciai-síkságon (Plovdiv) az agrotechnikai határidőn belül bevetett búza- és árpaállományok kis része van a bokrosodás stádiumában, amely a megfelelő áttelelési fázis.



Az időszak alatt nem várható jelentős csapadék, és a feltételek lehetővé teszik a metszési és fitoszisztás tevékenységek elvégzését a gyümölcsösökben. December harmadik dekádja alkalmas időszak néhány fagyálló zöldségnövény (borsó, sárgarépa, lóbab, hagyma stb.) téli bevetésére az ország déli régióiban.

Forrás: OMSZ