

Január szokatlanul magas hőmérséklettel kezdődik

Автор(и): Растителна защита
Дата: 03.01.2024 Брой: 1/2024



A tél eleji klímaanomáliák, a szokatlanul magas, sok helyen 20–21°C-ot meghaladó hőmérsékletek a szántóföldi régiók egyes részein a őszi vetésű növények növekedési folyamatainak újraindulásához vezettek. Az évszaknak nem megfelelő meleg időjárás az ország egyes szélsőséges délnyugati régióiban egyes korai virágzású cserje- és gyümölcsfajoknál, mint például a som, a sárgabarack, az őszibarack és a cseresznye, a rügyek korai és nemkívánatos duzzadását okozta.

Január elején az agrometeorológiai viszonyokat továbbra is a normál feletti hőmérsékletek és a szántóföldi régiókban a téli gabonafélék késleltetett növekedésének bekövetkezéséhez szükséges biológiai minimumot meghaladó napi átlagértékek határozzák meg.

Az első tíz nap második felében hőmérséklet-csökkenésre és az agrometeorológiai viszonyok változására számítanak. Az időszakban várható lehűlés megszünteti a téli gabonafélék késleltetett növekedését és gátolja néhány fásszárú faj idő előtti fejlődését, amely egyébként csökkentené a télállóságukat. A második és harmadik tíz napos időszakban az agrometeorológiai viszonyokat a klímanormákhoz közeli hőmérsékletek határozzák meg, amelyek a téli gabonaféléket nyugalmi állapotban tartják.

Januárban a búza és az árpa állományok különböző fenológiai stádiumokban telelnek át. A későn, ősz végén vetett téli gabonafélék a Băzovec, Nikolaevo, Kazanlak, Sliven és Chirpan agrometeorológiai állomásokon a kelés és a levélképzés kezdeti stádiumában vannak. A novemberben vetett állományokban Kneža, Targovište, Pazardžik, Haskovo és Ljubimec területén a harmadik levél stádium dominál. A búza és árpa állományok egy kis része a Duna-síkság egyes helyein – a Novachene agrometeorológiai állomás – és a Felső-Trákiai-alföldön, a Plovdiv régióban a szárhajtás stádiumában van, amely az áttelelés megfelelő fázisa. Januárban a várt minimum hőmérsékletek, akár mínusz 13°C-ig, nem jelentenek kockázatot a tartós növényekre és a szárhajtás fázisába lépett téli gabonafélékre. Hóborítástól mentes körülmények között a mínusz 10–13°C közötti értékek, ha hosszabb ideig tartanak, kritikusak lehetnek a későn vetett, gyengén kialakult állományokra. A januári, a normát megközelítő vagy azt meghaladó várt csapadék növeli a talaj nedvességtartalmát az egy- és kétméteres talajrétegekben. December végén a búza számára az egyméteres réteg talajnedvesség-tartaléka a szántóföldi régiók nagy részében a teljes vízkapacitás (TVK) 85–90%-a felett volt.

A hónap során a lombos gyümölcsfajok téli metszésének végrehajtására kedvezőbb körülmények az első tíz nap elején és a harmadik tíz nap napjainak nagy részén állnak elő.

Forrás: OMSZ