

Teendők a gyümölcsösben januárban

Автор(и): ас. Кирил Кръстев, Институт по декоративни и лечебни растения – София

Дата: 09.01.2024 *Брой:* 1/2024



Januárban a várt minimum hőmérsékletek – mínusz 13°C-ig – nem jelentenek kockázatot az évelő növényekre. A szokatlanul meleg időjárás korai és nemkívánatos rügyduzzadást váltott ki néhány korai virágzású cserje- és gyümölcsfajtánál, mint például a som, a sárgabarack, az őszibarack és a cseresznye, helyenként az ország legdélnyugatibb régióiban.

A hőmérsékletek most már csökkentek, és az agrometeorológiai viszonyok változása figyelhető meg. A hónap közepéig várható hideg időszak megakadályozza a korai virágzású cserje- és gyümölcsfajták idő előtti fejlődését, amely egyébként csökkentené a télállóságukat. A várt eső és hó a talaj 100 cm-es rétegében hozzájárul a talajnedvesség-tartalékok növeléséhez.

A második és harmadik tíznapos időszakban az agrometeorológiai viszonyokat a klímanormákhoz közeli hőmérsékletek fogják meghatározni.

A hónap folyamán a magtermő gyümölcsfajok téli metszésének végrehajtására kedvezőbb feltételek az első tíznapos időszak elején és a harmadik tíznapos időszak napjainak nagy részén állnak majd fenn. A téli permetezés nem megfelelő csapadékos területeken.



Agrártechnikai tevékenységek

Gyümölcsültetvényekben

- Folytatódik a gépi kontúr- és kézi metszés az alma- és körteültetvényekben;
- A hűtőházakban felügyelik a tárolási rend betartását.
- Folytatódik a régi támasztókonstrukciók javítása és az újak építése.
- Megkezdődik a trágya szállítása és szétszóródása az ültetvényekben, megfelelő időjárási viszonyok között.
- Gyűjtik a tavaszi oltáshoz szükséges oltóvesszőket.
- Ügyelnek a rétegezésre helyezett magvak védelmére.
- Meghatározzák az új ültetvények telepítésére szánt területet.

Eper ültetvényekben

- Megtömörítik a talajt az őszi ültetésű, a hőmérséklet-ingadozások és a hó hiánya miatt kiemelkedő eperpalánták körül.
- Megkezdődik az üvegházak fűtése a kényszerített epertermesztéshez.
- A korai epertermesztéshez szükséges műanyag alagutakat építik.

Málna ültetvényekben

- Új támasztókonstrukciókat építenek és a régieket javítják.
- A fiatal palánták kiemelkedésének megakadályozására megkötözik a talajt körülöttük, és ahol lehetséges, kb. 10 cm magasságig felhántolják a gyökértő fölé.

Feketeribizli ültetvényekben

- Folytatódik a termésre való metszés.
- Folytatódik a dugványok gyűjtése.
- Ügyelnek a tavaszi ültetésre szánt gyökeresedett növények megőrzésére.
- Megvizsgálják a gyökeresedő ágyásokat, és a kiemelkedés és a fagyás veszélye esetén megtömörítik a növények körüli talajt.
- Különös figyelmet fordítanak arra, hogy a hűtőházakban lévő gyümölcs ne melegedjen fel és romoljon el.
- Meghatározzák a ásványi műtrágyák igényét, és ahol lehetséges, biztosítják a tavaszi trágyázáshoz szükséges mennyiségeket.



Egyéb növényekkel telepített ültetvényekben

- Folytatódik a dugványgyűjtés az aktinídiából, az aróniából, a gránátalmafából, a homoktövisből és a fűgéből.
- Folytatódik az aktinídia magjainak gyűjtése, amelyeket rétegezésre helyeznek.
- Rendszeresen nedvesítik a rétegezésnek alávetett kaukázusi datolyszilva magjait, amelyeket a datolyszilva alanyaként fognak felhasználni.
- Az arónia magjait megtisztítják a húsos résztől, alaposan megmossák és rétegezésre helyezik pisztrángomokkal a pincékben.
- Folytatódik a dróttartókonstrukciók építése az aktinídia ültetvényekben.

Növényvédelmi beavatkozások

Téli permetezés végezhető fásszárú fajokon és a málnaültetvényekben.

A téli permetezés eredményessége akkor jó, ha a permetoldatot nagy cseppek formájában juttatják fel, és a fásszárú és félecserjék minden részét bevonják a permetoldattal. Fásszárú fajoknál ezt 100–150 dm³/hold permetlé mennyiséggel, erős permetezőgépekkel, szélcsendben lehet elérni.



a levélaknázó moly

Fásszárú fajok esetén:

A permetezést 3%-os Para Zomer vagy Acarzin oldattal végzik pajzstetvek és levéltetvek, levéldarazsak, almafapoloska, téli araszolók petéi, atkák, levélaknázó moly bábjai stb. ellen, amelyek a fatörzseken és a koronákban telelnek át. A permetezést csak akkor végzik, ha egyes kártevők egyedsűrűsége meghaladja a gazdasági kárküszöböt.



vörös levélfoltosság a szilván

A permetezést 2%-os bordói lével vagy egyéb rézalapú készítménnyel végzik a szilvazacskósság ellen a szilvában, a tűzeség ellen a magtermőkben, az őszibarack levélhajlító betegsége, a csonthéjasok lyukasfoltossága, a barna rothadás, a baktériumos elhalás, valamint a lehullott levelek permetezésével az áttelelő varasodás kórokozóinak elpusztítására az almában és körtében, a vörös levélfoltosság ellen a szilvában, a dió antraknózisa, a mandula cercospora levélfoltossága és varasodása ellen.



didymella a málna szárán

Málna esetén:

A didymella, coniothyrium, antraknózis és levélfoltosságok elleni kezelést 2%-os bordói lével vagy egyéb rézalapú készítménnyel végzik, és a lehullott leveleket is permetezik.

A kaliforniai pajzstetű ellen 3%-os Para Zomer vagy Acarzin oldattal végeznek kezelést.

Folytatódik a kertészeti gépek, öntözőberendezések, permetezőgépek, porlasztók és egyébek javítása.

Ügyelnek a növényvédő szerek nedvességtől való védelmére; beszerzik a szükséges mennyiségeket és raktárakban elhelyezik.

Készítenek entomológiai ketrecek, kereteket, izolátorokat és fénycsapdákat. Beszerzik a sárga ragadólapokat és a gyümölcsfák gazdaságilag jelentős kártevői elleni növényvédelmi beavatkozások előrejelzéséhez szükséges egyéb anyagokat.

Új mérgezett csalétek kerülnek elhelyezésre az egerek ellen a gyümölcsültetvényes anyag árkaiban.

Kiválasztják az új ültetvények telepítéséhez szánt fajtákat.