

Február – dinamikailag változó agrometeorológiai viszonyok

Автор(и): Растителна защита
Дата: 07.02.2024 Брой: 2/2024



Februárban az agrometeorológiai viszonyok nagyon dinamikusak lesznek, a havi klimatikus normát meghaladó és azzal egyenlő vagy azt alulmúló hőmérsékleti időszakok váltakozásával.

Az első tíz nap legtöbb napján az évszakhoz képest magas hőmérsékletek határozzák majd meg az agrometeorológiai viszonyokat. Az ország szántóföldi régióiban az előrejelzett átlagos napi értékek elérik és meghaladják a téli gabonafélék vegetatív folyamatainak újraindításához szükséges biológiai minimumot. A február első tíz napjának második felében az évszakhoz képest magasnak előrejelzett hőmérsékletek, a 15-20°C tartományban elérhető maximumértékekkel, idő előtti fejlődést indítanak el néhány korai virágzású csonthéjas gyümölcsfajban (mandula, kajszibarack, őszibarack) az ország déli és délkeleti régióiban.

Az első tíz nap végén és a második tíz nap elején változás következik be az agrometeorológiai viszonyokban. A várható hideg időszak visszafogja az őszi vetésű növények vegetációját és a gyümölcsfák idő előtti, nemkívánatos fejlődését.

Február második felében az ország legnagyobb részén az előrejelzett átlagos napi hőmérsékletek a telelő mezőgazdasági növények fejlődését visszafogó tartományokban lesznek. Kivételt a legdélebbi és délkeleti régiók jelenthetnek, ahol a hónap végén kedvező feltételek alakulhatnak ki az őszi vetésű növények késleltetett vegetációjának megindulásához, de a növények fenológiai stádiumaiban nem várható jelentős változás. Február végén a búzaállományokban a harmadik levél stádium lesz túlsúlyban.

A hónap során a mínusz 12°C-ig terjedő előrejelzett minimumhőmérsékletek meghaladják a harmadik levél és a szárhasadás stádiumban telelő búzaállományok kritikus küszöbértékeit. Hóborítástól mentes és hosszabb ideig fennálló körülmények között ezek az értékek kockázatot jelentenek a késői vetésű, kezdeti levélképződési stádiumban (1-2 levél) lévő téli gabonafélékre.

A februárra várható, a normát megközelítő vagy meghaladó csapadék növeli az őszi-téli talajnedvesség-készletet a kétméteres talajrétegben is. Január második tíz napjának végén a búza egy méteres talajrétegben mért nedvességekészlete az ország legnagyobb részén – néhány keleti régióbeli helyszín (Razgrad, D. Chiflik, Chirpan, Sliven) kivételével – a teljes vízkapacitás 90%-a feletti szinten volt.



A hónap során a szezonális agrotechnikai tevékenységek – szőlőültetvényekben és gyümölcsösökben a metszés, a gyümölcsfák téli réz-tartalmú fungicidekkel történő permetezése, az őszi vetésű növények nitrogéntartalmú ásványi műtrágyákkal történő tápanyag-utánpótlása, a korai tavaszi növények (borsó, búkköny, zab, tavaszi árpa) vetésére szánt területek előveti talajművelése – végrehajtására kedvezőbb feltételek az első tíz nap és a második tíz nap második felének legtöbb napján állnak majd fenn.



Februárban a búzatáblákat figyelemmel kell kísérni egy veszélyes kártevő, a mezei pocok jelenléte szempontjából, és ahol annak sűrűsége meghaladja a gazdasági károsítási küszöbértéket (GKK – 1 aktív kolónia/decárem), ott időben el kell végezni a rendeltetésszerűen engedélyezett rágcsálóirtó szerekkel a növényvédelmi intézkedéseket.

forrás: OMSZ