

Február végén – megfelelő feltételek a tavaszi gabonák vetésére szánt földek talajműveléséhez, a metszéshez és a növényvédő permetezéshez a tartós kultúrákban.

Автор(и): Растителна защита
Дата: 26.02.2024 Брой: 2/2024



Február végén az agrometeorológiai feltételeket továbbra is a biológiai minimum feletti napi átlaghőmérsékletek határozzák meg, amelyek szükségesek a téli gabonanövények vegetatív folyamatainak újraindításához és előrehaladásához. Az őszi-téli nedvességfelhalmozási időszak végén a művelt területek egy méteres talajrétegében a talajnedvesség-tartalék a teljes víztartó kapacitás (TÖK) 70-90%-a között mozog.

Az időszakban a későn vetett, fejlődésben elmaradt búza- és árpaállományokban a harmadik levél növekedési stádium figyelhető meg. A Duna-menti síkságon, valamint az ország déli régióinak egyes helyein – Băzovec, Knezha, Novachene, Nikolaevo, Dolni Chiflik, Targovishte, Silistra, Lyubimets, Plovdiv, Pazardzhik, Kyustendil és Sandanski agrometeorológiai állomásokon – a bokrosodási stádium lesz megfigyelhető. A csonthéjas gyümölcsfajokban a rügyek megduzzadása következik be.

Búzaöldi futrinka – *Zabrus tenebrioides*

Az időszak legtöbb napján, kivéve néhány nyugati régióbeli helyet, ahol csapadék várható, a feltételek megfelelőek lesznek: a tavaszi vetésre szánt földek talajművelésére; az állandó növényállományok metszésére és növényvédő permetezésére; a búza- és árpaállományok ellenőrzésére a réti pocok jelenléte és kártétele, valamint a búzaöldi futrinka lárváinak tekintetében. A téli gabonanövények vegetációjának újraindulása miatt prioritást kell adni az állományok nitrogén trágyázásának befejezésének.

Forrás: NIMH