

Március harmadik tíz napos időszaka alatt – fagyveszély

Автор(и): Растителна защита
Дата: 25.03.2024 Брой: 3/2024



A március második dekádjának végén és a harmadik dekádjának elején az ország szántóterületeinek számos pontján fagyok kialakulásához vezető feltételek alakultak ki, amelyek a gyümölcsfák virágzásának különböző mértékű károsodását okozták.

A következő hétnapos időszakban az agrometeorológiai viszonyokat ismét dinamikus időjárás fogja meghatározni. A napi átlaghőmérsékletek a őszi vetésű növények vegetációs folyamataihoz szükséges biológiai minimum felettire vannak előrejelzve. A búzában és az árпában a szárhasadás fázisa fog zajlani. Csak az ország déli régióinak egyes pontjain figyelhető meg a szárnyújtás fázisa.

A Dobrudzsa Mezőgazdasági Intézet (DMI) - General Toshevo adatai szerint 2023 októberétől február végéig a csapadék mennyisége összesen 205 liter volt négyzetméterenként. 2024 első két hónapjában azonban összesen 22 liter/négyzetméter csapadék hullott. Eközben 16°C feletti, egyes helyeken akár 19,6°C-ot is elérő magas hőmérsékleteket rögzítettek. Ilyen körülmények között a búza általában nem mezőgazdasági pihenőbe.

Az elmúlt években április hónapban már megszokott jelenségek tanúi lehetünk – éles hideghullámoknak, alacsony hőmérsékleteknek és fagyoknak. A tavaszi hideg, aszályjal kombinálva komoly hatással lehet a búzára.

Egyes vetésekben megfigyelhető a szeptóriás levélfoltosság jelenléte, de a gombaölő szerekkel történő kezelésre még túl korai – jelentette az Agri.bg-nak Kiryakov Ivan DMI-től származó professzor, PhD. Március végén a Mezőgazdasági Regionális Igazgatóság által létrehozott bizottság felülvizsgálja a búzaföldeket Dobrics megyében, hogy meghatározza a növények állapotát, fejlődési szakaszait és az esetlegesen felmerülő problémákat a gabonaterületeken.

Az állandó növényállományokban különböző fenológiai fázisok következnek be – a rüggyeduzzanástól és rügypattanástól a virágrüggyig, virágzásig és levelesedésig. Az időszak első napjaiban fagyokat és negatív minimumhőmérsékleteket jósolnak, amelyek kockázatot jelentenek a fejlett fejlődésű gyümölcstermő növényekre.

Az időszak második felében várható csapadék korlátozni fogja a mezei munkák lehetőségeit. A szezonális agrotechnikai tevékenységek – a napraforgó előkészítő talajművelése és vetése, valamint a mezőgazdasági növények növényvédő permetezése – végrehajtására kedvezőbb feltételek az időszak elején állnak rendelkezésre. A kezeléseket szélcsendben és legfeljebb 2-3 m/s szélesebségnél kell végezni. Az időszak alatt kezdődik a napraforgó vetésének optimális agrotechnikai időkerete Észak-Bulgáriában.

Forrás: NIMH és Agri.bg