

Хелиантекс™: Lágyszárú gyomirtás minden napraforgó-termesztési technológiában

Автор(и): Corteva Agriscience™
Дата: 31.03.2024 Брой: 3/2024

Хелиантекс™
Arylex™ active

ХЕРБИЦИД

**ОТВОРЕТЕ
ВРАТАТА
ЗА НОВОТО РЕШЕНИЕ**

CORTEVA™
agriscience

> Открийте повече

Heliantex™ szelektív, növényzeti időszakban alkalmazható gyomirtó, amelyet kifejezetten a napraforgóban gyakori legfontosabb széleslevelű gyomok elleni védekezésre fejlesztettek ki. Új hatóanyagával, az Arylex™ aktívval a Heliantex™ hatékony megoldást kínál a nehezen irtható gyomok kezelésére ebben a növényben.

Előnyök:

Szelektivitás: Heliantex™ szelektív minden napraforgó-termesztési technológiára (hagyományos, Express, Clearfield, csíkos, madarak számára, héjastalanító, élelmiszeripari), rugalmasságot biztosítva a napraforgó hibridválasztásban, amely minden követelményt kielégít.

Hatásspektrum: Olyan, más gyomirtókkal nehezen kezelhető gyomokat irt ki a vegetáció során, a BBCH 14 (4. valódi levél) és a BBCH 50 (virágrügyképződés) stádiumok között, mint például az *Ambrosia artemisiifolia*, *Chenopodium spp.*, *Abutilon theophrasti*, *Xanthium strumarium* és mások.

Nincs korlátozás a vetésforgó következő növényeire: Heliantex™ gyorsan lebomlik a talajban, alkalmazása után nincsenek korlátozások a vetésforgóban.

HELIANTEX™ alkalmazható alacsonyabb levegőhőmérsékleten más termékekhez képest, a termék 5 fokon történő alkalmazása is biztonságos a növényre.

Az ajánlott alkalmazási hőmérséklet 10°C felett van. A termék alkalmazása 25 fok felett nem ajánlott.

Hatásmód:

Heliantex™ szisztémás hatású a gyomokra, a növények vegetatív részein keresztül szívódik fel és szöveteken keresztül transzportálódik a növekedési pontjaikba. Látható hatás már néhány órával a kezelés után megfigyelhető, de a gyomok nekróziséhoz és kiszáradásához vezető teljes hatás a kezeléstől számított 1–3 héten belül jelentkezik, a gyom növekedési stádiumától függően.

Alkalmazás

Hagyományos technológia alatt:

1. Kelés előtti talajherbicide - vetés után, kelés előtt (ASBE)
2. **Heliantex™** 4.5 ml/da + 0.1% **VIVOLT™** - a teljesen kifejlett 4. levéltől a virágrügyig

Imazamox technológiák alatt

1. Imazamox a 2. levéltől
2. **Heliantex™** 4.5 ml/da + 0.1% **VIVOLT™** a 4. levéltől

Imazamox technológiák alatt kötelező, hogy a Heliantex™ elkülönülten kerüljön alkalmazásra az imazamox herbicidektől. A kezelések közötti időtartam minimum 3 nap lehet.

ExpressSun® technológia

1. **Express® 50 SG** 4 g/da + 0.1% Vivolt

2. **Heliantex™** 4.5 ml/da + 0.1% **VIVOLT™** a 4. levéltől

Az **ExpressSun®** technológia alatt a **Heliantex™** tartálykeverékben alkalmazható együtt az **Express® 50 SG**-vel.

HELIANTEX™ irtja a nehezen irtható, valamint a herbicid-rezisztens gyomokat is

minden technológiában, mint például:

Nagyon érzékeny

Parlagfű (*Ambrosia artemisiifolia*)

Fehér libatop (*Chenopodium album*)

Zsurló (Abutilon) (*Abutilon theophrasti*)

Érzékeny

Bozontos rekettye (*Xanthium strumarium*)

Éves mezei sárma (*Mercurialis annua*)

Repcemustár (*Sinapis arvensis*)

Háromszínű mályva (*Hibiscus trionum*)

Kanadai apróüröm (*Erigeron canadense* L.)

Fekete csucsor (*Solanum nigrum*)

Mérsékelten érzékeny

Szörös keserűfű (*Polygonum convolvulus*)

Kender (*Cannabis sativa*)

A Heliantex™ innovatív megoldást kínál a napraforgó gyomirtására, amely hozzájárul a terméspotenciál növeléséhez és növeli a termesztők rugalmasságát a hibridválasztásban és a termesztéstechnológiákban. Hatékonyságával és könnyű kezelhetőségével a Heliantex™ a régóta várt megoldás minden napraforgó-termesztési technológiában azokra a gyomokra, amelyeket más gyomirtókkal nehéz irtani.